© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 65. **LINNÆA,** 1885.

Naturhistorisches Institut, Berlin N. 4.
Invalidenstrasse 38.

Catalog für die deutsche malakozoologische Gesellschaft 1885, No. 6.

	Mk.
Murex.	
acicularis Lam. W. Indien	0,80-1
aduncospinosus Beck. Phil.	1-2,50
adustus Lam. Ceylon	0,50-1,50
affinis Reeve Philippinen	2,—
alveatus Kien. Panama	0,80-1
anguliferus Lam. Oc. ind.	1—3
axicornis Lam. Ceylon	0,50-1,50
Banksi Sow. Moluccen	3—4
bicolor Val. Californien	0,50-1,50
BourgeoisiTourn. Senegamb.	1,50-2
brandaris L. M. med.	0,50-2
brassica Lam. Californien	2—6
brevispina Lam. Ceylon	0,50-1,20
calcitrapa Lam. Ind. occ.	1-2,50
v. elongatus Lam. „	1—2
capucinus Chm. Philippinen	0,40-1,20
corallinus Scach. M. med.	0,30-40
cornutus L. Senegambien	2—5
corrugatus Sow. Australien	1-1,20
crassilabrum Gray, Chile	0,50-1
cristatus Broch. M. med.	0,30-40
Cumingi Ads. Philippinen	1—3
Dunkeri Krss. Cap.	0,20-50
Edwardsi Payr. M. med.	0,20-30
endivia Lam. Ind. occ.	1—4
erinaceus L. M. med.	0,40-1,50
v. tarentinus Lam. „	0,40-80
fasciatus Sow. Senegamb.	0,80-1,20
fiscellum Chm. Philippinen	0,40-1
foliatus Gmel. China	1—3
gibbosus Lam. Senegamb.	1—3
haustellum L. Phillppinen	0,80-1,50
hexagonus Lam. St. Thomas	0,40-1
imperialis Swains Californ.	3—5
lyratus Ads. Senegambien	1—3
Martinianus Reeve Austral.	1—2
maurus Brod. Australien	1-2,50
microphyllus Lam. Oc. ind.	2—3
motacilla Chm. „	2—3
nigrispinosus Reeve „	3—4
nigritus Phil. Californien	2—4
oxyacantha Brod. Panama	3—6
palmarosae Lam. Philipp.	4—6
palmiferus Swains. Austral.	1-1,50
pinnatus Wood China	1—3
plicatus Sow. Californien	1—2
pomum Gmel. Ind. occ.	0,50-1,50
princeps Brod. Californien	2—4
radix Gmel. Panama	1—10
ramosus L. Ind. or.	0,50-1,50
rectirostris Sow. Mexico	1-2,50
regius Wood Panama	1—3
rota Sow. M. rubr.	3—6
rubiginosus Reeve Philipp.	3—4
salebrosus King Panama	1—3
Salleanus Ads. Ind. occ.	1,50-2
saxatilis L. Oc. ind.	1—3
scolopax, Dillw. „	2—5
scorpio L. Philippinen	5—6
senegalensis Gmel. Brasilien	1—3
Steeriae Reeve Australien	20—30
Talienwahensis Cross N. Cal.	1—2
tenuispina Lam. Philipp.	2—10
ternispina Lam. „	1—3
tetragonus Brod. Mauritius	0,30-80
torrefactus Sow. Philippinen	2—3
tribulus L. Oc. ind.	1-2,50
triformis Reeve Australien	2—3
triqueter Born Philippinen	0,80-2
trunculus L. M. med.	0,30-1
uncinarius Lam. Cap.	0,50-1
unicornis Reeve Peru	0,50-1,20
vibex Brod. Panama	1-1,50
Triton.	
aquatilis Reeve Mauritius	0,50-1,50
agrotus Reeve China	1-1,50
Australis Lam. Australien	1,50-4
canaliferus Lam. Oc. ind.	0,80-1,20
chlorostomus Lam. Philipp.	0,30-1
clavator Chm. „	2
commutatus Dkr. W. Ind.	2-2,50
corrugatus Lam. M. med.	1—2
cutaceus L. „	0,50-1,20
cynocephalus Lam. Philipp.	0,50-1,50
femorale L. Oc. ind.	1—3
ficoides Reeve Senegamb.	1-2,50
fusiformis Kien. Mauritius	0,50-1,50
gallinago Reeve Philipp.	1-1,50
labiosus Wood Australien	0,50-1
lampas Lam. Mauritius	1—4
lotorium L. „	0,50-1,50
moritinctus Reeve „	0,50-1,50
mundus Gould „	0,30-60
nodiferus Kien. M. med.	1—3
olearium L. Brasilien	1—2
Pfeifferianus Reeve China	1,50-2,50
pilearis L. Mauritius	0,20-1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
pyrum Lam.	Mauritius	0,80-1,50
Quoyi Reeve	Australien	0,40-50
retusus L.	Philippinen	0,60-1,20
rubecula L.	„	0,30-60
sinensis Reeve	China	1—2
Spengleri Chm.	Australien	1-3,50
subdistortus Lam.	„	3—4
tripus Lam.	China	1-1,20
tritonis L.	Mauritius	1-2,50
tuberosus Lam.	Oc. ind.	0,20-50

Persona.

anus L.	Philippinen	1—2
cancellina Desh.	„	0,50-2
ridens Reeve	Ind. occ.	2—3

Lagena.

Chemnitzii Gray	Australien	1—2
cingulata Lam.	„	1—2
clandestina Chm.	Philippin.	1-1,50
doliaria L.	C. b. sp.	0,50-1,20

Argobuccinum.

cancellatum Lam.	Magell. Str.	3—5
Oregonense Lam.	Sitka	1—5
rudde Brod.	Chile	0,50-1,20
scaber King	„	0,50-1

Ranella.

affinis Brod.	Philippinen	0,50-1,20
albivaricosa Reeve	„	0,30-1
anceps Lam.	Panama	0,60-1
argus Gmel.	Australien	2—3
Bergeri Ads.	Mauritius	0,50-1,50
bitubercularis Lam.	Philipp.	0,50-1
crassa Dillw.	„	0,50-80
crumena Lam.	Oc. ind.	0,40-1,20
elegans Beck.	Nicobaren	1,50
foliata Brod.	Mauritius	1—3
granifera Lam.	„	0,30-50
gigantea Lam.	M. med.	1,50-4
gyrina L.	Philippinen	0,20-40
leucostoma Lam.	Australien	0,60-1,50
margaritula Desh.	Ceylon	0,50-80
perca Percy	China	8—12
pusilla Brod.	Australien	0,50-1
siphonata Reeve	Philipp.	0,50-1
spinosa Lam.	„	0,80-2
subgranosa Beck	„	0,50-80
triqueter Reeve	Californien	1—2
tuberculata	Mauritius	0,30-80
tuberosissima Reeve	Philipp.	1,50-2
ventricosa Brod.	Peru	1—3
vexillum Sow.	Australien	2—3

Aspa.

laevigata Lam.	Senegamb.	2—3

		Mk.

Oliva.

angulata Lam.	W. America	2—5
araneosa Lam.	Californien	0,30-60
carneola Gmel.	Philippinen	0,20-30
erythrostoma Lam.	Oc. ind.	0,30-1
episcopalis Lam.	Mauritius.	0,30-50
elegans Lam.	Philippinen	0,30-50
flammulata Lam.	Senegal	0,20-60
fusiformis Lam.	Oc. ind.	0,50-1
guttata Lam.	Philippinen	0,30-60
inflata Lam.	Sansibar	0,20-30
irisans Lam.	Philippinen	0,60-1,20
ispidula L.	„	0,10-30
Julieta Ducl.	Amer. c.	1-1,50
litterata Kien.	Ind. occ.	0,20-50
maura Lam.	Philippinen	0,50-1
mustellina Lam.	Ceylon	0,40-80
olympiadina Ducl.	Mauritius	1—2
ponderosa Ducl.	„	0,40-50
Peruviana Lam.	Peru	0,50-1
v. coniformis Phil.	„	0,40-80
porphyrea Lam.	Panama	1—4
reticularis Lam.	Ind. occ.	0,30-60
sanguinolenta Lam.	Molucc.	0,20-40
tesselata Lam.	Philippinen	0,20-40
tigrina Lam.	Madagascar	0,40-60
tremulina Lam.	Philippinen	0,40-1
v. nobilis Reeve	„	1—2
tricolor Lam.	Mauritius	0,20-40
venulata Lam.	Mazatlan	0,30-1

Olivancillaria.

acuminata Lam.	Senegal	0,80-1,50
Brasiliensis Chm.	Brasilien	0,50-1,20
gibbosa Born.	Oc. ind.	0,30-80
nebulosa Lam.	Siam	0,50-80
subulata Lam.	Oc. ind.	0,40-1

Aragonia.

aquatilis Reeve	Brasilien	0,80-1
auricularia Lam.	„	1-1,50
contortuplicata Reeve	„	0,80-1,20
hiatula Gmel.	Senegambien	0,40-80
Steeriae Reeve	„	0,40-60
testacea Lam.	Panama	0,40-80

Olivella.

jaspidea Gmel.	Ind. occ.	0,20-30
lanceolata Reeve	Philipp.	0,30-40
lineolata Gray	Californien	0,20-40
mutica Say	S. Carolina	0,10-20
myriadina Ducl.	Seychellen	0,20-30
nivea Gmel.	Ind. occ.	0,10-20
oryza Lam.	„	0,10
tergina Ducl.	Panama	0,30-40
undatella Lam.	Acapulco	0,10-30
Verrauxi Ducros	Guadeloupe	0,20-30
volutella Lam.	Panama	0,10-20

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren

Briefe einfach an die **„LINNÆA", Naturhist. Institut**

Berlin N. 4. Invalidenstrasse 38.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut,

Frankfurt am Main,

Elsheimerstrasse 7

macht sowohl **Museen,** als auch **Lehrinstitute** und **Private,** auf ihre Doublettenvorräthe naturhistorischer Gegenstände aufmerksam. Da das Institut mit auswärtigen Sammlern sowie wissenschaftlichen Reisenden eine stete Correspondenz unterhält, ist es auch im Stande, auf besondere Wünsche Rücksicht zu nehmen und eventuelle Desideraten direkt besorgen zu können.

Specialitäten: **Mollusken** (Conchylien), **Vogelbälge** und **Vogeleier,** worüber Special-Cataloge bereits ausgegeben sind. Ueber die respectiven Vorräthe an **Säugethierfellen, Amphibien, Fischen, Arachniden, Myriopoden, Crustaceen** und **niederen Seethieren** werden — sofern gedruckte Cataloge nicht vorhanden — auf Wunsch handschriftliche Listen angefertigt.

Auch **Insekten** aus allen Ordnungen, besonders **Macro-** und **Micro-Lepidopteren** sowie **Coleopteren** sind reichlich vertreten.

Grosses Lager in **Fossilien,** besonders des Mainzer Tertiär-Beckens.

Cataloge stehen franco und gratis zu Diensten.

Der ***Lehrmittel-Catalog,*** Repräsentanten aus dem Gesammtgebiete der Zoologie enthaltend, ist speciell für **Lehranstalten, Schulen** etc. bestimmt.

Tauschverbindungen erwünscht.

L'INSTITUT D'HISTOIRE NATURELLE

LINNÆA

à FRANCFORT s. MEIN,

Elsheimerstrasse 7

apelle l'attention des administrations de Musées, ainsi que des établissements d'enseignement et des amateurs, sur ses collections de duplicates d'objets d'histoire naturelle. En correspondance suivie avec les collectionneurs étrangers et les voyageurs scientifiques, il est à même de repondre aux demandes spéciales et de pourvoir directement aux *desiderata* les plus variés.

Spécialités: **Mollusques** (coquilles); **peaux et œufs d'oiseaux;** des catalogues spéciaux en ont déjà été publiés.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Quant aux collections de **peaux de mammifères d'Amphibies, poissons, arachnides, myriopodes, crustacés** et **specimens d'invertebrates maritimes,** des listes manuscrites sont envoyées sur demande lorsque les catalogues imprimés font défaut.

Les insectes de tout ordre, spécialement **les macro-** et **micro-lépidoptères** et **coléoptères,** sont aussi abondamment représentés.

Grand magasin en **Fossiles,** spécialement du bassin tertiaire de Mayence.

Catalogues franco et gratis sur demande.

Catalogue d'objets d'enseignement, contenant des spécimens de tout le domaine de la zoologie, destinés spécialement aux **établissements d'instruction, écoles** etc.

On demande à établir des relations d'échanges.

LINNÆA,

NATURAL HISTORY INSTITUTION,

FRANKFORT o. MAIN,

Elsheimerstrasse 7.

Calls the attention of museums, educational etablishments and private gentlemen to its stock of duplicates of natural historical objects; and being in constant correspondence with foreign collectors, as well as scientific travellers, it is in a position to have regard to any special requirement, or if necessary, to obtain any particular object direct.

Specialities: **Mollusca** (shells), **birds skins and eggs,** of whichs special catalogues have already been published. As regards the stock of **mammals, amphibia, fishes, arachnidae, myriopoda, crustaceae** and **marine animals** of a lower order, in cases where printed catalogues are not on hand, written lists will be furnished on application.

Insects of all genera, especially **macro-** and **micro-lepidoptera** and **coleoptera,** are largely kept.

Larges stocks in **Fossils,** specially from the tertiary basin of Mayence.

Catalogues furnished gratis and postpaid on application.

Educational catalogues containing representative animals, belonging to every class in zoology; specially adapted for the use of **schools** &c.

Arrangements for exchanges gladly entered into.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

LINNÆA,

Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

7 Elsheimerstrasse 7.

TAUSCH-CATALOG No. 2, 1885

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Land-Conchylien

aus dem palaearctischen Faunengebiet.

Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

		Mk.
Testacella.		
bisulcata Risso	Gallia	0,40-60
haliotidea Drap.(testa)	„	0,40-50
animal in Alkohol	„	1-1,50
Maugei Fér.	Lusitan	0,40-50
Daudebardia.		
brevipes Drap.	Germ.	2,—
Langi Pfr. (animal)	Hungar.	2—3
rufa Drap.	Germ.	2,—
Saulcyi Bourg. (testa)	Kreta	1—2
„ „ (animal)	„	2—3
Glandina.		
Algira L.	Europ. merid.	0,20-40
Parmacella.		
DeshayesiMoq.Tand	Algeria	0,60
Limax.		
cinereus List. (testa interior)	Gallia	0,20-30
Vitrina.		
alpestris Cless.	Tirol	0,30-40
brevis Fér.	Germ.	0,20-30
Carniolica Bttg.	Carn.	0,30-40
diaphana Drap.	Germ.	0,20
f. Heynemanni Koch	„	0,20
elongata Drap.	„	0,20
major Fér.	„	0,10-30
nivalis Charp.	Helvetia	0,30-40
pellucida Müll.	Germ.	0,10-20
v. aff. annularis	Tirol	0,20
truncata Bttg.	Carn.	0,30-40
Hyalinia.		
aegopinoides v. Maltz.	Kreta	1—3
Alhambrae Kob.	Hispan.	0,30-40
alliaria Mill.	Anglia	0,20-40
Balmei Pot. etMich.	Sardinia	0,30-50
Botterii Pfr.	Kreta	0,20-30
camelina Bourg.	Syria	0,30-40
cellaria Müll.	Germ.	0,10-20
v. Villae Mort.	Carn.	0,20-30
contracta Westl.	Germ.	0,20-30
crystallina Müll.	„	0,10
v. subterranea Bourg.	„	0,10-20
Cydoniensis Blanc.	Kreta	1-1,50
Cypria Pfr.	Cypern	1,—
deila Bourg.	Krim	0,40-50
Draparnaldi Beck.	Germ.	0,20-30
Erjaveci Brus.	Carn.	0,40-60
excavata Bean	Anglia	0,40 50
frondosula Mouss.	Graecia	0,20-40
fulva Drap.	Germ.	0,10
glabra Stud.	Transsylv.	0,20-30
hyalina Fér.	„	0,20-30
hydatina Rossm.	Kreta	0,20-30
Natolica Alb.	Brussa	0,50-1
nitens Mich.	Germ.	0,10-20
v. Helmi Gilb.	„	0,20
v. Szepi Hazay	Hungar.	0,20
nitida Müll.	Germ.	0,10
nitidula Drap.	„	0,10
petronella Charp.	„	0,10-20
protensa Fér.	Kreta	0,40-80
v. aequata Mouss.	Graecia	0,50-60
pura Alder	Germ.	0,10
radiatula Gray	Tirol	0,10
subrimata Reinhardt	„	0,10-20
superflua Rossm.	Kreta	1—2
Taurica Cless.	Krim	0,30-40
Zonites.		
acies Partsch	Dalm.	0,20-40
albanicus Ziegl.	„	0,30-50
Algirus L.	Gallia	0,30-50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
chloroticus Pfr.	Magnia	0,80-1,50
compressus Ziegl.	Carn.	0,30-50
Croaticus Partsch	Croatia	0,20-40
pergrannulatus Godet.	Graec.	0,50-1
Smyrnensis Roth	Smyrna	0,40-80
verticillus Fér.	Croatia	0,10-30
Leucochroa.		
argia Bourg.	Algier	0,50-60
Baetica Rossm.	Hispan.	0,50
Boissieri Charp.	Palaestina	0,30-40
candidissima Drap.	Algeria	0,10-20
cariosa Oliv.	Syria	0,20-30
v. crassicarina Mouss.	„	0,30-40
cariosula Mich.	Algeria	0,20
Debeauxiana Kob.	„	0,30-40
fimbriata Bourg.	Syria	1-1,20
Kobeltiana Deb.	Algeria	0,30-40
Mayrani Gass.	„	0,30-40
Otthiana Forb.	„	0,30-40
Patula.		
Hierosolymitana Bgt.	Syria	0,20
pygmaea Drap.	Germ.	0,10
ruderata Stud.	Tirol	0,10
rupestris Drap.	Germ.	0,10
v. chorismenostoma Blanc	Graecia	0,20-30
rotundata Müll.	Germ.	0,10
semiplicata Pfr.	Madeira	0,30-50
solaria Mke.	Austria	0,10-20
Janulus.		
stephanophora Desh.	Madeira	0,20-30
Helix.		
abjecta Lowe	Madeira	0,30
aculeata Müller	Germ.	0,10
acuta Müller	Europ. mer.	0,10
advena Webb. et B.	Capv.	0,40
alabastrites Mich.	Algeria	0,20-30
Alonensis Fér.	Hisp.	0,20-30
alpina Faure-Big	Chartreuse	0,20-40
angigyra Zgl.	Italia	0,20
Apennina Porro	„	0,20-30
aperta Born	Kreta	0,20
apicina Lm.	Gallia	0,10
arbustorum L.	Germ.	0,10
arcta Lowe	Madeira	0,30
Argentellei Kob.	Graecia	1-1,50
Arigonis Rssm.	Hisp.	0,20-40
armillata Lowe	Madeira	0,20
Ascherae Kob.	Italia	0,30-40
aspersa Müll.	Gallia	0,10
f. sinistrossa	„	2,—
f. scalaris	„	2—4
atrolabiata Kryn.	Kauk.	0,80-1,20
attrita Lowe	Madeira	0,30
Balearica Zgl.	Balear.	0,30-50
barbata Fér.	Kreta	0,40-50
barbula Charp.	Lusitan.	0,30-40
bathyomphala Charp.	Italia	0,20
bathytera Westl.	Kreta	0,30-40
bidens Ch.	Germ.	0,10
v. dibothrion Friv.	Trans.	0,40-50
Boettgeri Kob.	Marocco	1—2
Boissyi Terv.	Balearen	0,30-40
Bowdichiana Fér. subf.	Mad.	0,50-60
Bulwerii Wood.	„	0,30-40
caerulans Mühlf.	Dalm.	0,20
Caesareana Parr. (spiriplana aut.)	Syria	0,60-1
calva Lowe	Madeira	0,30
candicans Zgl.	Germ.	0,10
candidula Stud.	„	0,10
Cantiana Mft.	„	0,20
caperata Mtg.	Anglia	0,10-20
Caroni Dsh.	Sicil.	0,20-30
Castanea Oliv. (radiosa Zgl.)	Brussa	0,50-1
Carthusiana Müll.	Gallia	0,10-20
cespitum Drap.	„	0,20-30
cheiranthicula Lowe	Mad.	0,30-40
cincta Müll.	Italia	0,20-30
v. Pollini Camp.	„	0,30-40
cinctella Drap.	„	0,10-20
cingulata Stud.	„	0,10-30
v. Anauniensis Betta	„	0,20-30
v. carrarensis	„	0,20-30
v. colubrina Jan.	„	0,20-30
cingulella Zgl.	Hungaria	0,20-30
cobresiana Alt.	Tirol	0,10
codia Bourg.	Lusitan.	1-1,50
coelata Stud.	Germ.	0,20
Colomiesiana Bourg.	Algeria	0,20-30
compacta Lowe	Madeira	0,30
Companyoni Aler	Balear.	0,30-40
conoidea Drap.	Gallia	0,10-20
consors Lowe	Madeira	0,30
conspurcata Drap.	Lusitan.	0,10-20
Constantinae Forb.	Algeria	0,30-40
Coquandi Morl.	Hisp.	0,30-50
cornea Drap.	Gallia	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.			Mk.
corrugata Gm.	Sicil.	0,20-40	Hellenica Bourg.	Graeca.	0,20
costata Müller	Germ.	0,10	hieroglyphiculaMüll.	Algeria	0,20-30
v. pulchella Müller	„	0,10	hispida L.	Germ.	0,10
costulata Zgl.	„	0,10	v. concinna Jeffr.	Anglia	0,10-20
Cretica Fèr.	Kreta	0,10-30	Hoffmanni Partsch.	Dalm.	0,50-1
v. alba	„	0,20	holosericea Stud.	Helvetia	0,10-20
v. cauta Wl.	Graecia	0,10-20	homoleuca Stab.	Dalm.	0,20
crinita Sandri	Dalm.	1—2	hortensis Müll.	Germ.	0,10
cyclolabris Desh.	Graecia	0,20-40	Heynemanni Kob.	Marocco	0,30-40
v. Heldreichi Sh.	„	0,20-30	ichtyomma Held	Bavaria	0,20-30
v. sphaeriostoma Bourg.	„	0,30-50	v. achates Zgl.	Tirol	0,20
Dautezi Kob.	Algeria	0,20-40	improbata Mouss.	Syria	0,30-40
dealbata Lowe	Madeira	0,30	incarnata Müller	Germ.	0,10
degenerans Mss.	Marocco	1-1.20	intermedia Fér.	Carn.	0,20
Dehnei Rm.	„	0,30-40	Jolii Bourg.	Algeria	0,30-50
delphinula Lowe subf.	Mad.	0,30-60	Jourdaniana Bourg.	„	0,40-60
depauperata Lowe	„	0,20-30	Juilleti Terv.	„	0,30-40
depressula Parr.	Algeria	0,20-40	lactea Müller	Hisp.	0,10-20
derogata Rm.	Hispan.	0,20-30	v. alybensis Kob.	„	0,30-40
desertella Jick.	Abess.	0,50-80	Lacosteana Mor.	Algeria	0,80-1,20
desertorum Forsk.	Aegypt.	0,20-30	lamellata Jeffr.	Germ.	0,20-30
v. inflata	„	0,30	Langloisiana Bourg.	Syria	0,30
destituta Charp.	Italia	0,20	lanuginosa Boissy.	Balear.	0,30-40
Diensis v. Maltz.	Kreta	0,40-50	v. roseotincta Forb.	Algeria	0,20-30
Dupotetiana Terv.	Algeria	0,30-40	lapicida L.	Germ.	0,10
elata Faur. Big.	Sicil.	0,20-30	Ledereri Pfr.	Syria	0,20-40
elegans Gm.	Eur. mer.	0,10	Lefeburiana Fér.	Carn.	0,20-30
v. alba	Hispan.	0,10	lens Fér.	Graecia	0,10-20
ericetorum Müller	Germ.	0,10	v. lentiformis Zgl.	„	0,10-20
Eugenia Pfr. v. Huetiana	Sicil.	0,30-50	lenticula Fér.	Hisp.	0,10
			lenticularis Morl.	Maracco	0,50-80
euphorca Bourg.	Algeria	0,20-30	lentiginosa Lowe	Madeira	0,20-30
euxina Cless.	Krim	0,20-30	leptosticta Lowe	capverd	0,40-50
explanata Müller	Hispan.	0,20-30	limbata Drap.	Gallia	0,20-30
faustina Zgl.	Transsylv.	0,20-30	Loxana Rm.	Hisp.	0,30-50
figulina Parr.	Graecia	0,30-40	Lucasii Desh.	Algeria	0,30-40
filimargo Kryn.	Krim	0,20-30	lucorum Müll.	Italia	0,30-50
frequens Mouss.	Brussa	0,30-40	luteata Parr.	Lusitan.	0,30-40
Freytagi v. Maltz.	Kreta	0,80-1	lutescens Ziegl.	Transsylv.	0,30-40
frigida Jan.	Italia	0,20-30	macrostoma Mühlf.	Sicil.	0,30-40
fruticola Kryn.	Krim	0,30-40	Maderensis Wood.	Madeira	0,20-30
fruticum Müller	Germ.	0,10	Majoricensis Dhrn.	Balearen	0,30-40
fusca Mtg.	Anglia	0,30-40	maritima Drap.	Lusitan.	0,10-20
Galloprovincialis Dup. (cantiana pars)	Gallia	0,10-20	marmorata Fér.	Hisp.	0,30-40
			Maroccana Morl.	Marocco	1—2
glacialis Thomas	Mt. Cenis	0,30-40	Martensiana Tib.	Italia	0,20-30
Glasiana Sh.	Teneriffa	0,40-50	Massylaea Morl.	Algeria	1,50-2
globularis Zgl.	Sicil.	0,20-30	mauritanica Bourg.	„	0,20-30
Gobanzi Frauenf.	Carn.	0,20-30	Mazzullii Jan.	Sicil.	0,20-40
Grateloupi Grälls	Baleria	1—2	melanostoma Drap.	Gallia	0,20-30
Gualteriana L.	Hispan.	0,80-1,50	mesostena Westl.	Kreta	0,30-40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Michaudi Desh. Madeira	0,20
Milaschewitzschi Ret. Krim	0,20-30
Minoricensis Mittre Balear.	0,30-40
muralis Müll. Italia	0,10-20
v. undulata Sicil.	0,20-30
Naxiana Fér. Kreta	1-2,50
v. Westerlundi Blanc „	1—2
Nebrodensis Mandr. Italia	0,20-40
neglecta Drap. Gallia	0,20-30
nemoralis L. Germ.	0,10
v. albolabiata L. „	0,20
Newka Dhrn. Balearen	0,30-40
Niciensis Fér. Gallia	0,20-30
nitidiuscula Sow. Madeira	0,30-40
Nordmanni Parr. Kauk.	1,—
noverca Westl. Kreta	0,40-80
nummus Ehrbg. Syria	0,20-30
Nyeli Mittre Balearen	0,20-30
Oberndorfi Kob. „	0,30-40
obserata Lowe Madeira	0,20-30
obstructa Fér. Syria	0,20-30
obtecta Lowe Madeira	0,30
obtusata Zgl. Krim	0,30-40
obvoluta Müll. Germ.	0,10
Olivieri Fér. Graecia	0,20
v. parumcincta Parr. „	0,10-20
Oranensis Morl. Algeria	0,20-30
orduñiensis Kob. Hisp.	0,20-30
oxytropis Lowe Madeira	0,30-40
Paciniana Phil. Sicil.	0,20-30
Parrnasia Roth Graecia	0,40-60
= Codringtoni var.	
paupercula Lowe Madeira	0,20
pellita Fér. Graecia	0,20-30
f. major Kreta	0,40-50
personata Lmk. Germ.	0,10
phalerata Zgl. Carn.	0,10-30
phleobophora Lowe Madeira	0,40-50
„ subfossil „	0,20
piratarum Kob. Algeria	0,30-50
pisana Müller Gallia	0,10
f. sinistrorsa „	1—2
f. scalaris „	2—3
platychela Mke. Sicil.	0,20-40
polymorpha Lowe Madeira	0,20-30
v. pulvinata Lowe „	0,20-30
pomatia L. Germ.	0,10-20
v. compacta Haz. Hungar.	0,20-30
v. Hajnaldyana Haz. „	0,30-40
v. pannonica „ „	0,20-30
v. Pulskyana Haz. Hungar.	0,20-30
v. sabulosa „ „	0,10-20
v. solitaria „ „	0,20
pomacella Parr. Brussa	1-1,50
Ponsi Hid. Balearen	0-30,40
Portosanctana Sow. Madeira	0,30-50
Pouzolzi Payr. Dalm.	0,40-60
Preslii F. Schm. Carn.	0,20-30
Prietori Hid. Balearen	0,30-40
Pringi Pfr. Lusitan	0,20-30
profuga A. Schm. Kreta	0,10-20
v. major „	0,30
Psiloritana v. Maltz. „	0,40-50
punctata Müll. Hisp.	0,20-30
punctulata Sow. Madeira	0,30-40
„ subfossil „	0,20
pyramidata Drap. Italia	0,10
Pyrenaica Drap. Gallia	0,30-40
Quimperiana Fér. „	0,40-60
Raspaili Pfr. Corsica	0,50-80
Rothi Pfr. Kreta	0,20-40
rotula Lowe Madeira	0,40
Rozeti Mich. Algeria	0,30
rubiginosa Schm. Germ.	0,10
rufescens Penn. Anglia	0,10-20
v. clandestina Born Helvetia	0,10-20
v. danubialis Cless. Germ.	0,10-20
v. montana Stud. „	0,10-20
scabriuscula Desh. Sicil.	0,20-40
Scherzeri Zeleb. Hisp.	0,40-50
Schmidti Ziegl. Krain	0,20-30
sicanoides Kob. Marokko	1,50-2
Siderensis v. Maltz. Kreta	0,40-50
secernenda Rm. Dalm.	0,30-40
Seetzeni Koch Syria	0,20-30
sericea Drap. Germ.	0,10-20
serpentina Fér. Italia	0,20
serta Alb. Capverd.	0,30-40
setipila Zgl. Dalm.	0,30-40
setosa Zgl. „	0,30-40
sicana Fér. Sicil.	0,20-30
soluta Mich. Algeria	0,20-30
sphaerita Hartm. „	0,20-30
Sphakiota v. Maltz. Kreta	0,40-60
spirorbis Lowe Madeira	0,20
splendida Drap. Gallia	0,10-20
strigata Müller Italia	0,20-30
strigella Drap. Germ.	0,10
sublecta v. Maltz. (lecta aut.) Kreta	0,50-60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
f. minor	Kreta	0,30-40
subvariegata v. Maltz	„	0,30-50
suspecta Westl.	„	0,30-40
submeridionalis Bourg.	Algeria	0,20-30
subplicata Sow.	Madeira	1—2
„ subfossil	„	0,80
Sultana Morl.	Marokko	1,50-2,50
Surrentina A. Schm.	Italia	0,20
sylvatica Drap.	Helvetia	0,20
v. rhenana Kob.	Germ.	0,20
Syriaca Ehrbg.	Kreta	0,20-30
tectiformis Sow.	Madeira	0,30-40
testudinalis Lowe	„	0,50
thiarella Webb. (subf)	„	0,20
Thiesseana Mouss.	Graecia	0,20
tigrina Jan.	Italia	0,20-30
triaria Friv.	Transsylv.	0,20-30
trizona Zgl.	Hungar.	0,50-60
trochoides Poir.	Italia	0,10-20
tuberculosa Conr.	Syria	0,30-40
turbinata Jan. (Candiota)	Kreta	0,20-30
turricula Lowe	Madeira	0,50-60
turriplana Morl.	Lusitan.	0,30-40
umbilicaris Brum.	Carn.	0,20-30
v. albina Gredl.	Tirol	0,30-40
umbrosa Partsch	Germ.	0,10
undata Lowe	Madeira	0,40-50
„ subfossil	„	0,30
variabilis Drap.	Europ. mer.	0,10-20
v. virgata Mtg.	„	0,10-20
variegata Friv.	Graecia	0,10-20
ventricosa Drap.	Europ. mer.	0,10-20
vermiculata Müll.	-	0,10-20
v. minor	Kreta	0,20
v. pachychila	„	0,30-50
vicina Rm.	Transsylv.	0,30-40
Vindobonensis Pfr.	Hungar.	0,10-20
Zafferina Fér.	Algeria	0,20-40
v. Zelleri Kob.	„	0,20-40
Zelebori Pfr.	Serbia	0,20-40

Buliminus.

albiplicatus v. Mart.	Turkst.	0,60-80
Bergeri Roth	Graecia	0,20-30
bidens Kryn.	Krim.	0,20-40
v. costatus Retow.	„	0,20-30
carneolus Mouss.	Constant.	0,50-60
chondriformis Mouss.	Syria	0,30
Cretensis Pfr.	Kreta	0,50-80
v. elongata	„	0,80
detritus Müll.	Germ.	0,10
v. radiatus	„	0,10
v. inflatus Parr.	Brussa	0,30
dirphicus Blanc.	Graecia	0,30-40
eburneus Pfr.	Asiaminor	0,30-40
eremita Bens.	Turkest.	0,80-1
etuberculatus Frfld.	Graecia	0,50-60
Forbesi Morl. et Desh.	Azor.	0,30
Frivaldskyi Pfr.	Brussa	0,60-80
gibber Ziegl.	Krim	0,30
Graecus Beck	Graecia	0,40-50
Hohenackeri Kryn.	Caucas.	0,40-50
intumescens v. Mart.	Turkest.	0,40-50
labrosus Oliv.	Syria	1,—
v. diminutus Mouss.	„	0,60
lamelliferus Rossm.	Dardan.	0,20-30
Merduenianus Kryn.	Krim.	0,30-50
microtragus Rossm.	Thessal.	0,20-40
montanus Drap.	Germ.	0,10
niso Risso	Dardan.	0,20-30
obscurus Müll.	Germ.	0,10
obtusus Drap.	Austria	0,40-50
olivaceus Pfr.	Kreta	0,30-40
Olympicus Parr.	Brussa	0,40-50
orientalis Friv.	Constant.	1,20-1,50
Ossicus Bttg.	Thessalia	0,60-80
ovularis Oliv.	Syria	0,20-30
v. sulcidens Mouss.	„	0,20-30
pupa Brug.	Graecia	0,20
pusio Brod.	„	0,30-40
quinquedentatus v. Mühlf.	Dalm.	0,20-30
Raynevalianus Bourg.	Dard.	1-1,50
reversalis Bielz.	Transsylv.	
v. alpestris Bielz.	„	0,30-40
v. brevis Bielz.	„	0,30-40
v. venerabilis Parr.	„	0,30-40
Rossmaessleri Pfr.	Brussa	0,60-80
Saulcyi Bourg.	Syria	0,30-40
scapus Friv.	Syria	0,40-60
septemdentatus Roth.	„	0,20-30
sidoniensis Charp.	„	0,50-80
sogdianus v. Mart.	Turkest.	0,60-80
squalinus Rossm.	Brussa	0,20-30
Sturmi Küst.	„	0,80-1
subulatus Rossm.	Krim	0,30-40
tauricus Lang.	„	0,20-40
v. Retowskianus Cless.	„	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
v. zebriola Cless.	Krim	0,20-30
Thiesseanus Mouss.	Graecia	0,20-30
todillus Morl.	Algeria	0,30-40
Tournefortianus Fér.	Brussa	0,30
tridens Müll.	Germ.	0,10-20
v. eximius Rossm.	Trans.	0,20
zebra Oliv.	Graecia	0,10
v. boeticus Bourg.	„	0,20

Cionella.

acicula Müll.	Germ.	0,10
v. Liesvillei Bourg.	Syria	0,20
agraecia Bourg.	Algeria	0,30
amblya Bourg.	„	0,20-30
folliculus Gronov.	Hispan.	0,10-20
f. Vescoi Bourg.	„	0,10-20
gracilenta Morl.	Algeria	0,20-30
gracilis Lowe.	Madeira	0,20-30
Hierosolymarum Roth	Syria	0,20-30
Jani de Betta(veneta Charp.)	Tirol	0,30-40
Hohenwarti Rossm.	Italia	0,30-50
Letourneuxi Bourg.	Algeria	0,30-40
lubrica Müll.	Germ.	0,10
v. nitens Kok	„	0,20
mabilliana Fagot.	Gallia	0,20-30
Maderensis Lowe.	Madeira	0,20
Maltzani Cless.	Kreta.	0,30-40
melampoides Lowe.	Madeira	0,30-40
mitraeformis Lowe.	„	0,20-30
Moussoniana Bourg.	Syria	0,20-30
nanodea Bourg.	Algeria	0,20-30
oryza Lowe.	Madeira	0,20
ovuliformis Lowe	„	0,20-30
procerula Morl.	Algeria	0,30-40
pupaeformis Cantr.	Dalm.	0,20-30
tornatellina Lowe.	Madeira	0,20
tridens Pult	Germ.	0,20-30
v. Nouletiana Dup.	Gallia	0,30
triticea Lowe,	Madeira	0,20-30
tumulorum Bourg.	Graecia	0,20-30
vitrea Webb.	Madeira	0,10-20

Stenogyra.

decollata L.	Europ. mer.	0,10-20
v. cylindrica	Kreta	0,20

Pupa.

affinis Rossm.	Gallia	0,30-40
Algesirae Kob.	Hispan.	0,30-40
alpestris Alder	Danemark	0,20
angustior Jeffr.	Germ.	0,10
antivertigo Drap.	„	0,10
arctica v. Wll.	„	0,20
avenacea Brug.	Brussa	0,10
Bergamensis Charp.	Italia	0,10-20
biplicata Mich.	Gallia	0,20-30
v. excessiva Gredl.	Tirol	0,30
Brauni Charp.	Hispan.	0,20-30
Brondeli Bourg.	Algeria	0,20-30
calathiscus Lowe.	Madeira	0,20
calpica Westl.	Hispan.	0,30
cassida Lowe	Madeira	0,30-40
cheilogena Lowe.	„	0,20-30
claustralis Gredl.	Tirol	0,20-30
concinna Lowe	Madeira	0,20-30
conica Rossm.	Carn.	0,20-30
costulata Nilss.	Germ.	0,10-20
cylindracea D. C.	Brussa	0,10
doliolum Brug.	Germ.	0,10
v. scyphus Friv.	Constant.	0,10-20
dolium Mich.	Germ.	0,10-20
edentula Drap.	„	0,10-20
v. Gredleri v. Mart.	„	0,20
Farinessii Desm.	Gallia	0,20
Ferrari Porro.	Italia	0,10-20
ferraria Lowe.	Madeira	0,20
frumentum Drap.	Germ.	0,10
v. apennina Charp.	Italia	0,10-20
v. cylindracea	Dalm.	0,10-20
v. curta Küst.	Tirol	0,10-20
v. elongata Rossm.	„	0,10-20
v. Illyrica Rossm.	„	0,10-20
fusca Lowe.	Madeira	0,20
Genesi Gredl.	Tirol	3,—
granum Drap.	Kreta	0,10
gularis Rossm.	Carinth.	0,20
v. spoliata Rossm.	Tirol	0,20
irrigua Lowe.	Madeira	0,20-30
jumillensis Guir.	Hispan.	0,30-40
Kobelti Hid.	„	0,30
Kokeili Rossm.	Carn.	0,20-30
Lilljeborgi Westl.	Suetia	0,20-30
Lusitanica Rossm.	Lusitan.	0,30-40
manotiana Bourg.	Hispan.	0,30-40
megachilos Jan.	Italia	0,10-20
v. bigorriensis	Gallia	0,20
Michaudi Terv.	Algeria	0,30
millegrana Lowe.	Madeira	0,20
minutissima Hartm.	Germ.	0,10-20
monticola Lowe.	Madeira	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
Moulinsiana Dup.	Germ.	0,20
Mühlfeldtii Küst.	Dalm.	0,10
muscorum L.	Germ.	0,10
oblitterata Charp.	Hispan.	0,20-30
occulta Parr.	Sicil.	0,20-30
opisthodon Reinh.	Hungar.	0,20
pagodula Desm.	Germ.	0,10
v. gracilis Bttg.	Croatia	0,20
pallida Pfr.	Italia	0,20
v. amycta Parr.	„	0,10-20
Philippii Cantr.	Graecia	0,10
polyodon Mich.	Gallia	0,20
pusilla Müll.	Germ.	0,10-20
pygmaea Drap.	„	0,10
Pyrenaearia Mich.	Hispan.	0,30
v. saxicola Moq. Tand.	„	0,30
recta Lowe.	Madeira	0,20-30
Rhodia Roth.	Graecia	0,10-20
ringens Mich.	Hispan.	0,20
Rossmaessleri Schm.	„	0,30-40
saxicola Lowe. (seminulum Lowe.)	Madeira	0,20
secale Drap.	Germ.	0,10
v. Boileausiana Charp.	Gallia	0,20-30
Semproni Charp.	„	0,10-20
v. dilucida Ziegl.	Tirol	0,10-20
sphinctostoma Lowe.	Mad.	0,20-30
striata Gredl.	Tirol	0,20-30
Strobeli Gredl.	„	0,20
substriata Jeffr.	Germ.	0,20
superstructa Mouss.	Caucas.	0,20
Tingitana Kob.	Marocco	0,30
triplicata Stud.	Helvet.	0,10-20
truncatella Ziegl.	Transylv.	0,20-30
variabilis Drap.	Gallia	0,10-20

Balea.

perversa L.	Germ.	0,10

Clausilia.

Adelinae Ben.	Sicil.	0,20-30
Agesilaos v. Mart.	Graecia	0,30
agnata Partsch	Croatia	0,10
v. albescens Mke.	„	0,20
albocincta Pfr.	Dalm.	0,20
almissana Küst.	„	0,20-40
v. minor	„	0,20-30
Alschingeri Küst.	„	0,20-30
altecostata Pfr.	Graecia	0,40-50
amalthea Westl.	Kreta	0,30-40
v. similis Bttg.	„	0,30
anaphiensis Bttg.	Graecia	0,50
angustata Bielz	Transsylv.	0,30
approximans Ziegl.	Carn.	0,50-60
aquila Parr.	Dalm.	0,30
Arcadica Bttg.	Arcad.	0,50-60
archilabris Küst.	Dalm.	0,20-40
armata Kutsch.	„	0,20-40
Arthuriana Blanc.	Kreta	0,80-1
asphaltina Ziegl.	Carn.	0,20
baeotica Küst.	Graecia	0,40-50
Bergeri Mayer	Germ.	0,10-20
bicristata Friv.	Graecia	0,20
v. major	„	0,30
v. canaliculata Pfr.	„	0,20
v. tetragonostoma Pfr.	„	0,20-30
bidens L.	Italia	0,10
bidentata Ström.	Germ.	0,10
v. meridionalis Fagot	Gallia	0,20
v. septentrionalis Sch.	Norw.	0,20
Bielzi Parr.	Transsylv.	0,20
v. clathrata Friv.	„	0,30
v. Madensis Fuss	„	0,20-30
bilabiata Wagn.	Dalm.	0,20-30
binodata Ziegl.	„	0,20
v. consentanea Zigl.	„	0,30
bipalatalis v. Mart.	Kreta	0,30
v. gracilior Bttg.	„	0,20-30
biplicata Mtg.	Germ.	0,10
subsp. bohemica Cless.	„	0,20-30
Blanci v. Mart.	Graecia	0,20
blanda Ziegl.	Dalm.	0,40-50
Bogatensis Bielz	Transsylv.	0,30
Boissieri Charp.	Syria	0,20-30
Brusinae Kutsch.	Dalm.	0,50
byzantina Charp.	Kreta	0,30-40
v. intermedia A. Schm.	„	0,30
v. solidula Pfr.	„	0,20
f. minor	„	0,20
caerulea Fér.	Syria	0,10-20
v. amorgia Bttg.	Graecia	0,10-20
v. Antiparia Bttg.	„	0,10-20
v. birugosa Parr.	„	0,10-20
v. Naxia Bttg.	„	0,10-20
v. Nia Bttg.	„	0,10-20
v. TinorensiS Mouss.	„	0,10-20
Calcarae Phil.	Sicil.	1,—
callifera Küst.	Dalm.	0,20-30
cana Held	Germ.	0,10-20
v. iostoma A. Schm.	Transsylv.	0,30
v. Transsylvanica Bielz	„	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.			Mk.
Candida Pfr.	Kreta	0,40	denticulata Oliv.	Graecia	0,40-50
candidescens Ziegl.	Italia	0,10	detersa Ziegl.	Krim	0,30
v. cinerea Phil.	„	0,10-20	discolor Pfr.	Graecia	0,30
canescens Parr.	Transsylv.	0,10-20	v. inaequata Blanc	„	0,20-30
Carinthiaca A. Schm.	Carinth.	0,30	dissipata Bttg.	„	0,30-40
Carniolica Ziegl.	Carn.	0,30	divergens Klec.	Dalm.	0,30-40
Cattaroensis Ziegl.	Dalm.	0,10-20	Drakakisi v. Maltz.	Kreta	0,80-1
Chia Bttg.	Graecia	0,20-30	(= extensa Bttg. non Pfr.)		
v. Samia Bttg.	„	0,20-30	v. centralis Bttg.	Kreta	0,60-80
v. submarginata Bttg.	-	0,20-30	dubia Drap.	Germ.	0,10
cincta Rossm.	Carn.	0,10-20	v. gracilis Pfr.	Hungar.	0,20
v. Rossmaessleri Pfr.	„	0,10-20	v. Grimmeri Parr.	Germ.	0,20
circumdata Friv.	Brussa	0,30-40	v. major	Helvet.	0,20
clandestina Rossm.	Graecia	0,30	v. speciosa A. Schm.	Hungar.	0,20-30
v. Thiesseae Bttg.	„	0,30-40	v. Transsylvanica A. Schm.		
clara Bttg.	Kreta	1—2		Transsylv.	0,20
v. paucicostata Bttg.	-	1-1,50	v. Vindobonensis A. Schm.		
coarctata Mouss.	Graecia	0,20-30		Hungar.	0,20
comensis Schuttl.	Tirol	0,20-30	Duboisi Charp.	Caucas.	0,20
commutata Rossm.	Carn.	0,10-20	elata Ziegl.	Transsylv.	0,20
v. fusca de Belta	Italia	0,10-20	elegans Bielz	-	0,20
v. ungulata Ziegl.	Carn.	0,10-20	exarata Ziegl.	Dalm.	0,10-20
compressa Pfr.	Graecia	0,20-30	exigua Lowe.	Madeira	0,40-50
concilians A. Schm.	Transsyl.	0,20	extensa Pfr. (Vesti Böttg.)		
Conemenosi Bttg.	Graecia	0,30-40		Kreta	0,50-60
confusa Bttg.	-	0,40	v. orientalis Bttg.	„	0,40-50
conspurcata Jan.	Dalm.	0,10	v. maxima „	„	1,—
v. subcrenata Parr.	„	0,30	fallax Rossm.	Transsylv.	0,20
corpulenta Friv.	Brussa	0,20	filograna Ziegl.	Germ.	0,10-20
corrugata Drap.	Kreta	0,40-50	fimbriata Mühlf.	Illyr.	0,10-20
v. almyrosana Bttg.	„	0,30	v. pallida Jan.	„	0,10-20
v. homaloraphe Bttg.	„	0,40	formosa Ziegl.	Dalm.	0,20-30
subsp. inflata Oliv.	„	0,20	foveicollis Parr.	Caucas.	0,20-30
„ v. gracilior Bttg.	„	0,30	fulcrata Ziegl.	Dalm.	0,60
„ Draparnaldi Beck	„	0,50	Fussiana Bielz	Transsylv.	0,20
corynodes Held	Germ.	0,10-20	v. pruinosa Bielz	-	0,40
costulata Jan.	Italia	0,20-30	gastrolepta Ziegl.	Dalm.	0,20
crassilabris Küst.	Dalm.	0,30	v. Freyeri Küst.	„	0,20
v. callida Parr.	„	0,30	gibbula Ziegl.	„	0.10
Cretensis Rossm.	Kreta	0,80-1	v. peucetana Kob.	„	0,20
cruciata Stud.	Helvet.	0,10	glabella Pfr.	Kreta	0,60-80
v. minima A. Schm.	Germ.	0,20	glauca Bielz	Transsylv.	0,20
Dacica Friv.	Bosnia	0,30	v. minor Bielz	„	0,20
Dalmatina Partsch	Dalm.	0,20	glorifica Rossm.	„	0,30
v. minor Parr.	„	0,20	Goldfussi Bttg.	Graecia	0,60-80
decipiens Rossm.	„	0,20-30	Goldi Kutsch.	Dalm.	0,30-40
deltostoma Lowe	Madeira	0,20	Grabusana Bttg.	Kreta	1,—
v. obesiuscula Lowe	„	0,40	v. humillima Bttg.	-	0,60-80
v. undulata	„	0,20	gracilicosta Ziegl.	Krim	0,30
densestriata Ziegl.	Carn.	0,10-20	graciliformis Kutsch.	Dalm.	0,30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Grayana Pfr. Dalm.	0,30	Macarana Ziegl. Dalm.	0,20-30
grisea Desh. Graecia	0,10-20	v. stenostoma Rossm. „	0,30
Grohmanniana Partsch Pal.	0,20-30	maculosa Desh. Graecia	0,20-30
grossa Ziegl. Carn.	0,20-30	Maderensis Parr. Madeira	0,30-40
gulo Rossm. Transsylv.	0,30-40	maesta Fér. Syria	0,20-30
Haueri Bielz „	0,30-40	magniventris Küst. Dalm.	0,20-30
Helenae Klec. Dalm.	0.40-50	Maltzani Bttg. Kreta	1—2
hetaera Friv. Bospor.	0,40-50	marginata Ziegl. Transsylv.	0,20
hians Bttg. Alban.	0,30-40	Marisi A. Schm. „	0,30
Hippoliti Blanc Kreta	1,—	maritima Klec. Dalm.	0,30-40
Huebneri Rossm. Natolia	0,40-60	v. Thiesseana Bttg. Graecia	0,30-40
humilis Küst. Transsylv.	0,40-50	MeschendoerferiBielz.Trans.	0,40-50
incisa Küst. Italia	0,20	Messenica v. Mart. Graecia	0,20
incommoda Bttg. Zante	0,20-30	modesta Ziegl. v. interpicta Cephalon.	0,20-30
interrupta Ziegl. Carn.	0,10-20	montana Stentz Transsylv.	0,20-30
f. albina Carn. „	0,10-20	v. viridana Ziegl. „	0,30
Josephinae Bttg. Graecia	0,30-50	Montenegrina Küst. Dalm.	0,30-40
isabellina Pfr. „	0,20	Moreletiana Blanc Kreta	0,60
Itala v. Marts. Italia	0,10-20	v. minor „	0,50
v. Braunii Charp. Germ.	0,20	mucida Ziegl. Carn.	0,10-20
v. ornata Bttg. Italia	0,10-20	v. badia Rossm. „	0,10-20
v. punctulata Mich. „	0,20	v. fontana F. Schm. „	0,30
v. rubiginea Ziegl. „	0,20	munda Ziegl. Smyrna	0,30-40
Kephissiae Roth. Graecia	0,20	muralis Küst. Dalm.	0,50-60
Krueperi Zel. v. furcilla Westl. Graecia	0,30-40	naevosa Fér. v. corcyeensis Mouss. Graecia	0,20-30
v. holostoma Bttg. „	0,30-40	v. epirotica Mouss. „	0,20-30
Kutschigi Küst. Dalm.	0,30-40	v. senilis Rossm „	0,20-30
v. contracta Ziegl. „	0,30	negropontina Pfr. „	0,20-30
laevissima Ziegl. „	0,10-20	v. costulata Thiesse „	0,20-30
v. pachygastris Partsch „	0,20	nobilis Pfr. Sicil.	1—2
v. superstructa „ „	0,20	notabilis Küst. Dalm.	0,50-60
lamellata Ziegl. „	0,40	ornata Ziegl. Tirol	0,10-20
lamellosa Wagn. „	0,20	v. gracilis Bttg. „	0,20
laminata Mtg. Germ.	0,10	orthostoma Mke. Germ.	0,10
v. alpestris Bielz Transsylv.	0,20-30	v. filiformis A. Schm. Trans.	0,10-20
v. dubiosa Cless. Carn.	0,10-20	Oscari Thiesse Graecia	0,60-80
latestriata Bielz Transsylv.	0,20	osculans v. Mart. „	0,20-30
Letochana Gredl. Tirol	0,30	pachychila Ziegl. Dalm.	0,20
v. Funki Küst. „	0,30	pachystoma Küst. „	0,20
leucoraphe Blanc Graecia	0,30-40	v. minor „	0,20
leucostigma Ziegl. Italia	0,10	Pagana Ziegl. Transsylv.	0,20-30
v. candidilabris Porro „	0,10	Parreyssi Ziegl. „	0,30
v. opalina Ziegl. „	0,20	parvula Stud. Germ.	0,10
lineolata Held. Germ.	0,10	Pauli Mab. Gallia	0,30-40
v. modulata Parr. Italia	0,20	Pfeifferi Küst. Dalm.	0,20
Lischkeana Parr. Transsylv.	0,10-20	piceata Ziegl. Italia	0,20
v. cornea A. Schm. Germ.	0,10-20	v. gracilior Charp. „	0,20
Lowei Alb. Madeira	0,80	Pikermiana Roth Graecia	0,20
lunellaris Pfr. Graecia	0,20		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
plicata Drap.	Germ.	0,10
forma implicata	„	0,20
plicatula Drap.	„	0,10
v. nana Schm.	„	0,20
plumbea Rossm.	Transsylv.	0,10-20
v. cornea Ziegl.	„	0,10
praeclara Pfr.	Kreta	1—2
profuga Charp.	Graecia	0,30-40
pumila Ziegl.	Carn.	0,10-20
v. sejuncta A. Schm.	Germ.	0,20
v. succosa A. Schm.	Trans.	0,20
punctulata Küst.	Italia	0,10
regalis Parr.	Transsylv.	0,20
regina Küst.	Dalm.	0,30-40
regularis Parr.	„	0,30-40
robusta Küst.	„	0,30
v. minor	„	0,20
Rolphi Leach	Anglia	0,20-30
rugicollis Ziegl.	Hungar.	0,20-30
v. carissima Rossm.	„	0,30
v. maxima A. Schm.	„	0,20-30
v. oleata Rossm.	„	0,30
rugosa Drap.	Gallia	0,10-20
rupestris Friv.	Brussa	1,—
rupestris Friv.	Olymp.	1—2
satura Ziegl.	Dalm.	0,20-30
saxicola Parr.	Graecia	0,10-20
Schmidti Pfr.	Carn.	0,20-30
Schwerzenbachi	Charp.Brus.	0,20-30
semilamellata Mouss.	Cauc.	0,40-50
semirugata Ziegl.	Dalm.	0,20
v. pygmaea Ziegl.	„	0,20
v vibex Rossm.	„	0,20
septemplicata Phil.	Sicil.	0,20-30
serrulata Midd.	Caucas.	0,50-60
Sirki Parr.	Dalm.	0,50-60
solida Drap.	Gallia	0,10-20
soricata Pfr. v. bifilosa Blanc	Graecia	0,20
Spratti Pfr.	Kreta	1-1,50
spreta Friv.	Constant	0,40-50
Stentzi Rossm.	Carn.	0,10-20
v. cincta Brum.	„	0,10-20
straminicollis Parr.	Trans.	0,10-20
v. occidentalis	„	0,20
striata Pfr.	Kreta	0,40-50
strigata Pfr.	„	0,40
v. acuticosta Bttg.	„	0,50
v. centralis	„	0,50
strigillata Mühlf.	Dalm.	0,20
Strobeli Porro	Italia	0,20
strumosa Friv.	Brussa	0,20
Stussineri Bttg.	Thessal.	0,60-80
sublamellosa Bttg.	Kreta	0,60-80
v. oblitterata Bttg.	„	1,—
subvirginea Bttg. v. farcimen Bttg.	Kreta	0,80
succineata Ziegl.	Dalm.	0,10-20
sulcosa Wagn.	„	0,20
v. diminuta Parr.	„	0,20
Syracusana Phil.	Sicil.	0,20-30
tenuicostata Pfr.	Kreta	0,50-60
v. mitis Bttg.	„	0,40-50
v. strictecostata Bttg.	„	0,40-50
teres Oliv.	„	0,50
v. hierapetrana Bttg.	„	0,40
v. phalanga Bttg.	„	0,60
v. f. minor	„	0,40
v. subcostata Bttg.	„	0,50
v. f. minor.	„	0,30-40
Thermopylarum	Pfr. Graecia	0,40-50
Thessalonica Friv. v. crassilabris Bttg.	Thessal.	0,40-50
v. spreta Friv.	Constant.	0,40-50
Tiesseae Bttg.	Graecia	0,40-50
tichobates Parr.	Dalm.	0,40-60
torticollis Oliv.	Kreta	1,50-2
troglodytes A. Schm. v. vexans Bttg.	„	0,40-50
Tschetschenica	Bayer Cauc.	0,30-40
tumida Ziegl.	Transsylv.	0,20-30
turgida Ziegl.	„	0,20-30
v. elongata Rossm.	Hungar.	0,30
turrita Pfr.	Graecia	0,20
umbilicata Bttg.	Dalm.	0,50-60
vallata Mouss.	Janina	0,30-50
varians Ziegl.	Germ.	0,10-20
v. diaphana Ziegl.	Carn.	0,10-20
venosa Bttg.	Kreta	1.—
ventricosa Drap.	Germ.	0,10-20
venusta A. Schm.	Graecia	0,30-40
vetusta Ziegl.	Carn.	0,20
v. festiva Küst.	Germ.	0,10-20
v. striolata Parr.	Transsylv.	0,20-30
Villae Mühlf.	Italia	0,40-50
virgata Jan.	„	0,20
v. affinis Phil.	Sicil.	0,20
virginea Pfr. v. leucoderma Bttg.	Kreta	0,50-60
Voithi Rossm.	Graecia	0,30
xanthostoma Bttg.	Kreta	0,60-80

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
Succinea.		
elegans Risso	Germ.	0,20
v. Baudoniana Haz.	Hungar.	0,20-30
v. levantina Desh.	„	0,20-30
v. Piniana Haz.	„	0,20
Hungarica Haz.	„	0,20
v. hasta Haz.	„	0,20
Kobelti Haz.	„	0,20-30
lapponica Cless.	Suetia	0,30-40
lenta West.	„	0,20-30
longiscata Morl.	Gallia	0,20-30
oblonga Drap.	„	0,10-20
v. arenaria Bouch.	Germ.	0,20-30
v. elongata Cless.	Suetia	0,20-30
Pfeifferi Rossm.	Germ.	0,10-20
v. debilis Morl.	Carn.	0,20-30
v. recta Baud.	Germ.	0,20-30
putris L.	Hungar.	0,10
v. acuta Haz.	„	0,20
v. angusta Haz.	„	0,20
v. Clessiniana Haz.	„	0,20-30
v. fontana Haz.	„	0,20
v. grandis Haz.	„	0,30
v. Westerlundiana Haz.	„	0,20
Suecica Cless.	Anglia	0,20-30
Valcourtiana Bourg.	Gallia	0,20-30
Carychium.		
minimum Müll.	Germ.	0,10
v. inflata	Kreta	0,20
striolatum Bourg.	Tirol	0,20
tridentatum Bourg.	Gallia	0,20
Zospeum.		
alpestre Freyer	Carn.	0,50-60
costulatum Freyer	„	0,50-60
Freyeri Schm.	„	0,50-60
obesum Schm.	„	0,50-60
pulchellum Frauenf.	„	0,50-60
reticulatum Hauffen	„	0,50-60
Schmidti Frauenf.	„	0,40-50
spelaeum Rossm.	„	0,60-80

		Mk.
Acme.		
Banatica Desh.	Transsylv.	0,60-80
cryptomena Folin	Gallia	0,50-60
gracilis Cless.	Carn	0,60-80
lineata Hartm.	Germ.	0,30-40
polita Hartm.	„	0,40-50
spectabilis Rossm.	Carn.	1.-1.50
Cyclostoma.		
costulatum Ziegl.	Hungaria	0,20-30
elegans Müll.	Europ. mer.	0,10
ferrugineum Lam.	Balear.	0,20
mamillare Lam.	Algeria	0,20-30
Olivieri Roth	Syria	0,50-60
sulcatum Drap.	Sicil.	0,20
v. multisulcatum Pott	„	0,30
Pomatias.		
apricus Mouss.	Gallia	0,20-30
auritus Ziegl.	Dalm.	0,20
Canestrinii Adami	Italia	0,30-40
cinerascens Rossm.	Dalm.	0,20-30
Croaticus Zeleb.	Croatia	0,20
gracilis Küst.	Dalm.	0,20-30
Hellenicus Bourg.	Graecia	0,40-50
Henricae Strobel	Tirol	0,10-20
Hidalgoi Crosse	Hispan.	0,30
Hirzi Stoss.	Croatia	0,20-30
Hispanicus Bourg.	„	0,40
Lapurdensis Folin.	Gallia	0,30-40
nanus Westl.	Croatien	0,20-30
obscurus Drap.	Gallia	0,20
patulus Drap.	Carn.	0,10
Philippianus Gredl.	Italia	0,30-40
Pinianus Bourg.	„	0,20-30
plumbeus Westl.	Carn.	0,20
scalarinus Villa	Dalm.	0,20-30
septemspiralis Raz.	Carn.	0,10
v. Heydenianus Cless.	„	0,10-20
tesselatus Rossm.	Graecia	0,20-30
Vallae Stoss.	Italia	0,20

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren
Briefe einfach an die „LINNÆA", Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Tausch-Catalog 1883 No. 6.

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

		Mk.
Strombus		
auris Dianae L.	Ind. or.	0,40-1
australis Sow.	Austral.	2,00
Campbelli Gray	„	1-1,20
canarium L.	Ceylon	0,30-60
columba Gm.	Philppn.	0,60-80
cylindricus Sws.	I. d. fr.	0,40-80
dentatus L.	Ind. occ.	0,80-1
elegans Sow.	M. rubr.	0,50-1
epidromis L.	Philppn.	0,50-1
fasciatus Born	Oc. ind.	0,40-60
floridus Lm.	„	0,20-50
„ „ var. minor	„	0,20-30
fusiformis Sow.	M. rubr.	0,80-1
gibberulus L.	Ind. or.	0,20-60
gigas L. c. op.	Ind. occ.	4—5
gracilior Wood	Californien	1—2
granulatus „	Amer. c.	1-1,50
haemastomus L.	Mauritius.	0,30-50
inermis Sow.	Ind. occ.	2—3
Isabella Lm.	Philippn.	0,40-60
laciniatus Ch.	Amboina	10,—
lentiginosus L.	Philippn.	0,40-80
lobatus Sw.	Ind. occ.	0,40-1,00
luhuanus L.	Philippn.	0,30-50
maculatus Nutt.	I. Sandw.	0,60-80
marginatus L.	Ind. or.	1,50
melanostomus Sw.	Philippn.	2—3
minimus L.	„	0,20-40
novae-zelandiae Ch.	N. Zeal.	3—5
papilio Ch.	N. Guin.	5—7
peruvianus Sw.	Peru	3—5
plicatus Lm.	Ind. or.	0,20-40
pugilis L. c. op.	Ind. occ.	0,80-1,50
pyrulatus Lm.	Florida	1—2
rugosus Sow.	Ind. or.	1,50
Ruppellii Rve.	M. rubr.	0,40-80
succinctus L.	Ceylon	0,50-80
septimus Ducl.	China	2,—
terebellatus Sow.	Philippn.	1-1,50
tricornis Lm.	M. rubr.	1,00-1,50
urceus L.	Ind. or.	0,20-40
„ var. chrysostomus	„	0,30-50
variabilis Sw.	Philippn.	0,40-60
vittatus L.	„	0,60-1,20
Rostellaria		
curvirostris Lm.	M. rubr.	2—3
crispata Sow.	Philippn.	1—2
Pterocera		
aurantia Lm.	Ind. or.	1-1,50
chiragra L.	„	1-1,50
elongata Sws.	Philippn.	3—4
lambis L.	Ind. or.	0,50-1
multipes Desh.	M. ind.	4—5
scorpio L.	Molucc.	1—2
Aporrhais		
occidentalis Beck.	N. Fundl.	5—8
pes-carbonis Bronn	Mittelm.	2—5
pes-pelecani L.	Europ.	0,20-80
Struthiolaria		
pes struthio cameli L.	N. Zeal.	2,50-3,00
Terebellum		
subulatum Lm.	Oc. ind.	0,50-1,20
Priamus		
stercus-pulicum Ch.	Cadix	20,—
Cypraea		
albuginosa Maw.	Calforn.	2—3
angustata Gm.	N. Holl.	1,50-3
annulus L.	M. ind.	0,10-30
arabica L.	Ind. or.	0,20-60
arabicula Lm.	Columb.	0,40-60
arenosa Gray	I. Anna	0,40-1
argus L.	Oc. ind.	1—2
asellus L.	Ind. or.	0,10-20
aurantium Martyn.	Tahiti	0,30 40
caput serpentis L.	Ind. or.	0,20-30
carneola L.	Austr.	0,20-60
caurica L.	Oc. ind.	0,10-40
cervinetta Kien	Peru	0,50-1
cernica Sow.	Mauritius	1—2
cervus L.	M. anst.	2—3
cinerea Gm.	Ind. oc.	1—2
clandestina L.	M. asiat.	0,10-20
Comptoni Gray	N. Holl.	2.—
cribaria L.	Oc. ind.	0,40-80
cribellum Gask.	Maurit.	1-1,50
cylindrica Barn.	Philippn.	1—2
eburnea Barn.	„	1—2
edentula Sow.	Afric. mer.	1-2,50
erosa L.	Oc. ind.	0,10-30
errones L.	Ind. occ.	0,10-30
esontropia Ducl.	Austr.	1—2
exantherna L.	Ind. occ.	0,60-1
felina Gm.	Oc. ind.	0,20-50
fimbriata Gm.	Japan	0,20-30
gangrenosa Dillw.	China	0,20-40
helvola L.	Oc. ind.	0,10-20
hirundo L.	„	0,10-20
interrupta Gray	Philippn.	1-1,50
irrorata Sol.	Pacif.	0,50-60
Isabella L.	Mdgscr.	0,10-30
Lamarki Gray	„	0,50-80
lurida L.	Oc. atl.	0,20-60
lynx L.	Oc. ind.	0,10-40
mappa L.	„	1,50-3
„ var. rosea	„	3—5

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
mauritiana L.	Oc. ind.	0,50-1,20
Menkeana Dsh.	Maurit.	0,40-60
microdon Gray	Philippn.	0,40-50
miliaris Gm.	Japan	0,50-80
moneta L.	Ind. or.	0,10-20
mus L.	Oc. atl.	0,40-1
neglecta Sow.	Ind. or.	0,30-50
nivosa „ (schön)	Siam.	80,—
obvallata Lm.	Tahiti	0,20-50
ocellata L.	Ceylon	0,20-30
onyx L.	„	0.60-1,20
„ var. adusta Lm.	„	0,80-1
pallida Gray	Japan	2,—
pantherina Soland.	M. ind.	0,30-80
picta Gray	Senegal	1-1,50
poraria L.	Austr.	0,10-30
pulchella Sw. (nicht schön)	China	2—4
punctulata Gray.	Panama	0,30-50
physis Brocchi	M. Med.	10—20
punctata L.	Philippn.	0,40-60
pyrum Gm.	M. med.	0,50-1
reticulata Martyn	Austr.	0,40-1
„ var. minor	„	0,20-30
„ „ histrio	„	0,50 1
Scottii Brod.	N. Holl.	15—20
scurra Ch.	Oc. ind.	0,50-1,20
Sowerbyi Ant.	Calif.	1—2
spurca L.	M. med.	0,20-50
stercoraria L.	Afric.	0,50-1,50
V. rattus „	„	0,50-1,20
stolida „	Ceylon	1—2
subcylindrica Sow.	Austral.	2,—
subviridis Rve.	„	1,50-2,50
tabescens Soland.	Oc. ind.	0,50-1,20
talpa L.	M. ind	0,30-1
testudinaria L.	Oc. ind.	2—3
tigris L.	Ind. or.	0,30-1
turdus Lm.	M. ind.	0,20-40
umbilicata Sow.	Austr.	8—12
ursellus Gm.	Oc. ind.	0,20-40
undata L.	„	0,20-40
variolaria Lm.	„	0,20-40
ventriculus „	Austral.	0,80-1,50
vitellus L.	Oc. ind.	0,20-40
ziczac L.	„	0,20-40

Trivia

Adansoni Gray	Mauritius	3,—
annulata „	I. Georg.	0,80-2
australis Lm.	N. Holl.	0,40-50
californica Gray.	Californ.	0,20-40
candida Gask.	Philippn.	0,20-40
Childreni Gray	Maurit.	0,30-80
cicercula L.	Pacif.	0,20-40
europaea Mft.	Europa	0,10-30
globulus L.	Ind. or.	0,40-50
insecta Migh.	I. Sandw.	0,30-50
margarita Soland	Austr.	1-1,50
nivea Gray	„	0,20-40
nucleus L.	Maur.	0,20-40
oryza Lm.	M. ind.	0,20-30
ovulata „	Cap.	1—2
pacifica Gray	Gallop.	0,40-1
pediculus L.	Ind. occ.	0,20-30
pulex Soland	M. med.	0,10-30
pustulata „	Panama	0,50-1
quadripunctata Gr.	Ind. occ.	0,20
radians Lm.	Mexico	0,30-60
sanguinea Gray	Columb.	0,20-40
scabriuscula Gray	I. Ticao	0,20-40
staphylaea L.	Oc. ind.	0,10-30
V. limacina Lm.	Philippn.	0,10-20
subrostrata Gray.	Ind. occ.	0,30-50
suffusa „	Gallop.	0,20-30
tricornis Jouss.	Maur.	0,50-1
vitrea Gask	Cap.	0,50-1

Ovula

Adriatica Sow.	M. med.	0,30-60
carnea Poir.	„	0,20-30
ovum L.	Oc. ind.	0,30-1

Calpurnus

verrucosus L.	Philipp.	0,40-80

Cyphoma

gibbosa L.	Oc. ind.	0,20-30

Birostra

formicaria Sow.	Cochinch.	0,40-60
spelta L.	M. med.	0,50-60

Pediculariа

pacifica Pease	Pacific.	1-1,50

Cancellaria

asperella Lam.	Philipp.	3—5
buccinoides Sow.	Callao.	2-3,50
cancellata L.	M. med.	1—2
costifera Sow.	Philipp.	1—3
littorinaeformis Sow.	Ceylon	3—4
lamellosa Hind.	Cap.	2,50
obliquata Lam.	Jansibas	2-2,50
piscatoria Desh.	Sénégal	1,50-2,00
rugosa Lam.	Ind. occ.	1—2
scalata Sow.	Maur.	1-1,50
scalarina Lam.	„	2—3
spirata Lam.	Oc. ind.	3—4
semidisjuncta Sow.	Philipp.	3—4
similis Sow.	Sénégal	1-2,50

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschver. 10% Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren

Briefe einfach an die **„LINNÆA", Naturhist. Institut**
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Binnen-Conchylien
aus dem paläaretischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.
Succinea	
putris L.	0,10
„ var. Clessiniana Haz.	0,20-30
„ „ grandis „	0,30
„ „ fontana „	0,20
„ „ olivula Baudon	0,20-30
„ „ angusta Haz.	0,20
Pfeifferi Rossm.	0,10-20
Hungarica Hazay	0,20
„ var. hasta „	0,20
elegans Risso	0,20
„ var. Baudoniana Haz.	0,20-30
„ „ Piniana Haz.	0,20
„ „ levantina Desh.	0,20-30
oblonga Drap.	0,10-20
Kobelti Haz.	0,20-30
Carychium	
minimum Müll.	0,10
„ var. inflata Bttg.	0,20
striolatum Bourg.	0,20
Zospeum	
Schmidti Frauenf.	0,50-60
obesum Schm.	0,50-60
reticulatum Hauffen	0,50-60
Marinula	
aequalis Lowe	0,20-30
Vulkani Mor.	0,20-30
Alexia	
Balearica Dohrn	0,20-30
myosotis Drap.	0,10-20
„ var. ringens	0,10-20
ciliata Mor.	0,20-30
Limnaea	
auricularia L.	0,10-20
„ var. costellata	0,10-20
„ „ ventricosa Hartm.	0,10-20
subsp. ampla „	0,20-30
„ tumida Held	0,20-30
„ Monardi Hartm.	0,20-30
lagotis Schrank	0,10
„ var. acutalis Mor.	0,10-30
mucronata Held	0,20
„ var. rubella Cless.	0,20-30
„ „ rosea Gall.	0,20
ovata Drap.	0,10
„ var. inflata Kob.	0,10-30
„ „ Piniana Haz.	0,20-30
„ „ fluminensis Cless.	0,10-20
„ „ intermedia Fér.	0,20-30
peregra Drap.	0,10
„ var. callosa Ziegl.	0,10-20
„ „ frisia Friedel	0,20
„ „ marginata Mich.	0,20
„ „ curta Cless.	0,10-20
„ „ rivularis Parr.	0,20
„ „ thermalis Boubée	0,10-20
stagnalis L.	0,10-20
„ var. lacustris Stud.	0,20-30
„ „ borealis Bourgt.	0,10-20
palustris Müll.	0,10
„ var. corvus Gmel.	0,10-20
„ „ distorta Rossm.	0,10-20
„ „ septentrionalis Cls.	0,10-20
„ „ fusca C. Pfr.	0,10
„ „ Clessiniana Haz.	0,20
„ „ Baudoniana „	0,10-20
„ subsp. turricula Held	0,20-30
syriaca Mouss.	0,30-40
glabra Müll.	0,10-20
„ var. Thiessea Cless.	0,20-30
parvula Haz.	0,10-20
taurica Cless.	0,20-30
truncatula Müll.	0,10
„ var. conica Jeffr.	0,10-20
persica Parr.	0,30-40
natalensis Krauss.	0,30-40
alkaensis Dall. (defect)	0,50-60
Traski Tryon	0,40-50
Pingeli Beck	0,60-80
Amphipeplea	
glutinosa Müll.	0,20-30
Physa	
hypnorum L.	0,10
fontinalis L.	0,10-20
acuta Drap.	0,20
Isidora	
contorta Mich.	0,20
Forskali Ehrenb.	0,20-40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Leucosia	
Stiedae Dyb. (Baikal-See) .	2—3
Benedicta	
fragilis Gerst.	8,—
baicalensis Gerstf. . . .	2—3
Planorbis	
corneus L.	0,10
„ var. minor	0,20
„ „ similis Blz. . .	0,20-30
Dufourei Graells	0,30-40
„ var. medjidjensis Fbs.	0,30-40
albus Müll.	0,10
„ var. lemniscatus Hartm.	0,20
Gredleri Bielz	0,20-30
Rossmaessleri Auersw. . .	0,20-30
limophilus Westl.	0,20
glaber Jeffr.	0,10-20
piscinarum Bourg. . . .	0,20-30
hebraeus „ . . .	0,30-40
agraulus „ . . .	0,20-30
nautileus L.	0,10
cristatus Drap.	0,10
carinatus Müll.	0,10-20
„ var. dubius . . .	0,20
umbilicatus Müll.	0,10
„ var. major . . .	0,20
„ „ attica Bourg.	0,20-30
„ „ graeca Cless.	0,20-30
vortex L.	0,10
verticulus Troschel . . .	0,20
„ var. acies Villa .	0,20-30
rotundata Poir.	0,10
spirorbis L.	0,10
„ var. Hazayanus Cless.	0,20
septemgyratus Ziegl. . .	0,20-30
Villae Adami	0,20-30
contortus L.	0,10
„ var. dispar. Westerl.	0,20
complanatus L.	0,10-20
riparius West.	0,20
concinnus „	0,20-30
nitidus Müll.	0,10
Clessini Westerl.	0,10-20
Ancylus	
pileolus Fér.	0,20
Jani Bourg.	0,20
capuloides Jan.	0,10-20
fluviatilis Drap.	0,10
„ var. simplex Bourgt.	0,10-20
lacustris L.	0,10
abyssinicus Jickeli . . .	0,20-30
Cyclostoma	
sulcatum Drap.	0,20
elegans Müll.	0,10
costulatum Ziegl.	0,20-30
mamillare Lm.	0,20-30
ferrugineum Lm.	0,20
Pomatias	
auritus Ziegl.	0,20
cinerascens Rossm. . . .	0,20-30
gracilis Küst.	0,20-30
Gredleri Westl.	0,20-30
Henricae Strobel	0,10-20
Hidalgoi Crosse	0,30-40
Lapurdensis Folin . . .	0,30-40
Martensianus v. Möll. . .	0,20-30
obscurus Drap.	0,20
patulus „	0,10
septemspiralis Raz. . . .	0,10
Heydenianus Clessin . . .	0,10-20
tesselatus Rossm.	0,20-30
Assiminea	
Grayana Leach	10—20
Hydrocena	
cattaraensis Ziegl. . . .	0,10-20
Paludina	
contecta Millet	0,10-20
fasciata Müller	0,10-20
atra Christ et Jan. . . .	0,30-40
hungarica Haz.	0,40-50
ussuriensis Gerrtl. Amur.	3,—
unicolor Oliv.	0,20-40
„ var. biangulata .	0,30-40
Cleopatra	
bulimoides Oliv.	0,20
„ var. trifasciata .	0,20-30
cyclostomoides Küst. . .	0,40-50
Bithynia	
tentaculata L.	0,10
„ var. bottnica And.	0,20
„ „ thermalis Haz.	0,20
„ „ producta Mke.	0,20
ventricosa Gray	0,20
„ var. Troscheli Paasch	0,20
rubens Mke.	0,20
Boissieri Charp.	0,20
Orsini „	0,10-20
sennariensis Küst. . . .	0,40-50
Hydrobia	
stagnalis Bast.	0,10
„ var. Girardoti Pal.	0,10-20
„ „ pictonum „	0,10-20
acuta Drap.	0,10-20
„ var. Brondeli . . .	0,10-20
achaja Clessin	0,10-20
Thiesseae „	0,10-20
balthica Nils	0,10
Kutschigi Küst.	0,10-20
consociella Frauenf. . . .	0,10-20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
gagathinella Parr.	0,10-20
longiscata Bourg.	0,30
oranensis „	0,10-20
Bithynella	
abbreviata Mich.	0,10-20
austriaca Frauenf.	0,10
Charpentieri Roth	0,10-20
Dunkeri Frauenf.	0,10
Ferussina Desm.	0,20
hungarica Haz.	0,10-20
Heynemanni „	0,10-20
lata Frauenf.	0,10-20
opaca Ziegl.	0,10
Schmidti Charp.	0,10
„ var. prasina Schm.	0.10
turgidula Pal.	0,10 20
tornensis Haz.	0,10-20
viridis Poir.	0,20-30
pannonica Frauenf. (Lithoglyphus.)	0,10-20
Amnicola	
conovula Parr.	0,10-20
cretica Cless.	0,20-30
Dupotetiana Forb.	0,10
Gaillardoti Bourg.	0,20
globulus Müll.	0,20-30
insubrica Charp.	0,10-20
luccensis Stab.	0,20-30
macrostoma Küst	0,10-20
marginata West.	0,20-30
negropontina Cless.	0,10
Salinessii Phil.	0,10-20
seminulum Charp.	0,10-20
similis Drap.	0,10-20
vestita Ben.	0,20
Frauenfeldtia	
Lachaineri Charp.	0,10
„ var. alpestris Villa	0,10-20
tergestana	0,10-20
Reynesi Dup.	0,20-30
Vitrella	
acicula Held	1,—
pellucida Benz	1,—
Robiciana Cless.	1,—
vitrea Drap.	1,-1,50
Belgrandia	
gibba Drap.	0,10-20
Bourguignati Pal.	0,20-30
Delpretiana Paul.	0,20-30
varica Pag.	0,20-30
Emmericia	
patula Brum	0,10-20
„ var. ventricosa Kutsch.	0,10-20
Klecaki Bourg.	0,20-30

	Mk.
Lithoglyphus	
naticoides Fér.	0,10
„ var. aperta Küst	0,20
„ „ prasina Kok	0,20
fluminensis Sadl.	0,10
pygmaeus Frauenf.	0,10-20
fuscus Pfr.	0,20-30
Valvata	
piscinalis Müll.	0,10
„ var. alpestris Blaun	0,10-20
„ „ antiqua Sow.	0,10-20
„ „ fluviatilis Col.	0,10-20
macrostoma Steenb.	0,10-20
cristata Müll.	0,10
tolosana St. Simon	0,20-30
baicalensis Gerstf.	1,-1,50
Choanomphalus	
Maacki Gerstf. (Baical-See)	1,-1,50
Schrencki Dyb. „	1,-1,20
valvatoides „ „	1,-1,20
Melania	
Hollandri Fér.	0,10-20
„ var. elegans Schm.	0,20-30
„ „ afra Ziegl.	0,20-30
„ „ dalmatina	0,10-20
parvula Schm.	0,30-40
tuberculata Müll.	0,10-20
Melanopsis	
acicularis Fér.	0,10-20
„ var. Audebardi Prev.	0,10-20
thermalis Brot.	0,10-20
Esperi Fér.	0,20-30
buccinoides Oliv.	0,10-20
praerosa L.	0,10-20
costata Oliv.	0,20-30
„ var. jordanica Roth	0,20-30
nodosa Fér.	0,60-80
Dufourei Fér.	0,10-20
„ var. Graëllsi Villa	0,20-30
lorcana Guirao	0,20-30
cariosa L.	0,20-30
Pyrgula	
annulata Mühlf.	0,20
Neritina	
nilotica Rve. (africana)	0,20-30
Jordani Sow.	0,20
„ var. turris Mouss.	0,20-30
„ „ interposita Mouss.	0,20-30
Michoni Bourg.	0,20
Danubialis Mühlf.	0,10
„ var. stragulata Mühlf.	0,10
„ „ carinata Kok	0,10-20
„ „ serratilinea Ziegl.	0,10-20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
fluviatilis L.	0,10
„ var. halophila Klett.	0,10
„ „ littoralis L.	0,10
„ „ salonitana L.	0,10
„ „ thermalis Boul.	0,10-20
„ „ rhodocalpa Jan.	0,20
„ „ dalmatina Ziegl.	0,10-20
transversalis Ziegl.	0,10
meridionalis Phil.	0,10-20
Velascoi Graëlls	0,10-20
valentina „	0,20-30
praevostiana Partsch	0,10
baetica Lm.	0,10-20
peloponnesiaca Recluz	0,10-20
Unio	
littoralis Lm.	0,20-40
„ var. elongatus Dup.	0,40-50
„ „ umbonatus Rossm.	1-1,20
ater Nils	0,10-30
„ var. consentaneus Ziegl.	0,20-40
„ „ reniformis Schm.	0,20-40
batavus Lm.	0,20
„ var. rivularis Rossm.	0,20-30
„ „ amnicus Ziegl.	0,20-30
atrovirens Schm.	0,20-40
desectus Drouët	0,80-1
pictorum L.	0,20-30
longirostris Ziegl.	0,30-40
spinelli Villa	0,40-50
cumanus Kob.	0,80-1
Moreleti Desh.	0,50-60
pallens Parr.	0,50-60
tumidus Retz.	0,20-30
„ var. saccatus Rossm.	0,40-50
aegyptiacus Call.	0,20-30
Margaritana	
margaritifera Retz.	0,80-1,20
„ var. minor Rossm.	0,50-80
Anodonta	
cygnea L.	1—3
cellensis Schrt.	0,20-1
rostrata Kock	0,30-50
piscinalis Nils	0,20-30
„ var. ponderosa C. Pfr.	0,40-80
„ anatina L.	0,20-30
idrina Spinelli	0,30-40
submacilenta Serv.	0,40-50

	Mk.
Mutela	
nilotica Fér.	1-2,50
rostrata Rang	1—2
Sphaerium	
riviculum Leach	0,10-20
solidum Norm.	0,20
corneum L.	0,10
nucleus Stud.	0,10
Scaldianum Norm.	0,10-20
mamillanum Westl.	0,10-20
Draparnaldi Cless.	0,10-20
Wildi Cless.	0,20-30
pallidum Gray	0,20-30
lacustris Müll.	0,10
Steinii Ad. Schm.	0,10-20
hungarica Haz.	0,20-30
Rykholti Norm.	0,20-30
Pisidium	
amnicum Müll.	0,10
„ var. elongatum Baud.	0,10-20
supinum A. Schm.	0,10
Henslavianum Shepp.	0,10
milium Held	0,10-20
„ var. Normandianum Dup.	0,20
subtruncatum Malm.	0,10-20
pulchellum Jen.	0,20
globulare Cless.	0,20
pallidum Jeff.	0,10
nitidum Jen.	0,20
obtusale C. Pfr.	0,10
„ var. personatum Malm.	0,20-30
roseum Scholz	0,20-30
intermedium Gass.	0,10-20
rivulare Cless.	0,10-20
fossarinum „	0,10
„ var. acuminatum	0,10
„ var. curtum	0,10-20
Heldreichi Cless.	0,10-20
casertanum Poli.	0,20
italicum Cless.	0,10-20
Corbicula	
fluminalis Müll.	0,30-50
radiata Parr.	0,40
pusilla Phil.	0,50-1
Dreissana	
polymorpha Pall.	0,10-20

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA", Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 50. 1884.

LINNÆA

Naturhistorisches Institut
(Dr. A. Müller)
FRANKFURT AM MAIN
7, Elsheimerstrasse 7.

Preis-Verzeichniss

über

Tertiär-Fossilien

des Mainzer und Wiener Beckens sowie von Sternberg und Tuchořic.

FOSSILES TERTIAIRES.
TERTIARY FOSSILS.

Preise in baar in Mark. — 1 Mark = 1 Shilling Engl. = 1.25 Francs.

Ohne Verbindlichkeit. Emballage zum Selbstkostenpreis.

Die mit * bezeichneten Arten werden bei einfacher Preisberechnung in zwei bis drei Exemplaren gegeben.

Einige Arten sind nur in wenigen oder einzelnen Stücken vorhanden.

Mainzer Becken.

1) Weinheim-Alzei.

Gasteropoda.

	Mark.
*Murex conspicuus A. Br.	0,20
Pleurotoma belgica Goldf.	0,30-60
Tritonium flandricum de Kon.	0,30-80
„ foveolatum Sandbgr.	0,40-1
*Buccinum cassidaria Bronn.	0,20
Voluta modesta Mer.	0,50-80
„ Rathieri Héb.	0,50-1
Cassidaria depressa v. Buch	0,50-4
Natica crassatina Lmk.	0,60-1,50
* „ Nysti d'Orb.	0,20
„ hantoniensis Sow.	0,30-40
Conus symmetricus Desh.	0,20-50
Chenopus tridactylus A. Br.	0,30-40
Cypraea subexcisa A. Br.	0,30-1
Bittium lima Brug.	0,20
Cerithium dentatum Grat.	0,50-1
* „ margaritaceum Brocc. var. moniliformis Grat	0,20
* „ plicatum Brug. var. papillatum Sandbgr.	0,20
„ Lamarcki Desh.	0,20-30
*Cerithium laevissimum Schloth.	0,20-40
* „ subvaricosum A. Br.	0,20-40
* „ dissitum Desh.	0,20-30
Vermetus Sandbergeri Bttgr.	0,20-40
Xenophora Lyelliana Bosq.	0,20-40
Trochus rhenanus Mer.	0,20
* „ sexangularis Sandbgr.	0,20-50
„ „ margaritula Mer.	0,20-30
*Dentalium Kickxi Nyst.	0.20
„ Sandbergeri Nyst.	0,20
Tornatella Nysti Duch.	0,30-40
Bulla Laurenti Bosq.	0,20

Acephala.

	Mark.
Panopaea Heberti Bosq.	1,50
Corbula gibba Oliv.	0,20
*Corbulomya Henckelusiana Nyst.	0,30-60
„ elongata Sandbgr.	0,50
Thracia elongata Sandbgr.	1,-1,50
Tellina Nysti Desh.	0,50-1
*Cytherea incrassata Sow. var. lunulata Sandbgr.	0,20-50
* „ splendida Mer.	0,20-50
„ „ var. postera Meyer	0,50
Cyprina rotundata A. Br.	1—4
*Cyrena semistriata Desh.	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark.
*Cardium cingulatum Goldf. . .	0,20-60
„ Raulini Desh.	0,60
Isocardia subtransversa d'Orb. .	0,30-1
*Chama exogyra Br.	0,30-50
*Lucina tenuistria Héb. . . .	0,20-40
„ Heberti Desh.	0,50
„ squamosa Lmk.	0,30
Astarte plicata Mer	0,40
*Crassatella Bronni Mer . . .	0,20-30
*Cardita tuberculata Münst. . .	0,20-30
* „ paucicostata Sandbgr. . .	0,30
*Modiola micans Br.	0,50-1
Perna Sandbergeri Desh. . . .	0,40-1,50
Arca Sandbergeri Desh. . . .	0,30-1
*Pectunculus obovatus Luck. .	0,20-50
* „ angusticostatus Lmk. . .	0,20-50
Limopsis Goldfussi Nyst. . . .	0,60
*Nucula Lyelliana Bosq. . . .	0,20-40
*Pecten pictus Münst.	0,20-40
„ compositus Goldf.	0,60
Ostrea cyathula Lmk.	0,20-30

Diversa.

Cacharodon angustidens Agass. Zahn	3—5
*Lamna cuspidata Agass. 6 Zähne verschied. Stellung . . .	1,—
* „ contortidens Agass. 6 Zähne verschied. Stellung . . .	1,25
Notidanus primigenius Agass. Zahn	0,50-1
Balanus stellaris Bronn. . . .	0,50
*Balanophyllia sinuata Reuss. .	0,20-30

2) Hochheim-Flörsheim.

Gasteropoda.

Stenomphalus cancellatus Thomae	0,20-50
*Cerithium plicatum Brug. var. multinodosum A. Br. . .	0,20
„ plicatum var. pustulatum A. Br.	0,30
*Hydrobia aturensis Noul. . .	0,20
*Neritina pachyderma Sandbgr. .	0,20-50
Oleacina Sandbergeri Thomae .	0,30-60
Cochlicopa lubricella A. Br. . .	0,30-60
Trochonanina imbricata A. Br. .	1—2
*Archaeozonites subverticillus Sandbgr.	0,50-80
Hyalinia impressa Sandbgr. . .	1,—
Trichia apicalis Reuss.	1,25-2,50
Omphalosagda Goldfussi Thomae	0,30-50
Strobilus uniplicatus A. Br. . .	0.50
Helix pomiformis A. Br. . . .	2—6
„ Ramondi Brongn. . . .	2—3
„ Rahti A. Br.	1—3
„ stenotrypta A. Br. . . .	0,50-2
„ lepidotricha A. Br. . . .	0,50-2
„ rugulosa G. v. Mart. . .	0,20-40
* „ oxystoma Thomae . . .	0,30-50
*Helix hortulana Thomae . . .	0,20-30
* „ deflexa A. Br.	0,20
* „ osculum Thomae	0,30-40
„ phacodes Thomae . . .	1—2
„ involuta Thomae	1—2
Patula disculus A. Br.	1,—
„ euglypha Reuss	1.—
Buliminus gracilis Thomae . .	1—2
*Pupa subvariabilis Sandbgr. .	0,40-60
* „ subtilissima A. Br. . . .	0,50
* „ suturalis A. Br.	0,50
„ didymodus A. Br. . . .	0,50
* „ quadrigranata A. Br. . .	0,50
„ impressa Sandbgr. . . .	0,50
* „ cryptodus A. Br.	0,50
*Cyclostoma antiquum Brongn. .	0,20-30
*Strophostoma tricarinatum A. Br.	0,20-30
„ „ var. minor	0,50
*Pomatias labellum Thomae . .	0,40-60

Acephala.

Cytherea incrassata Sow. var. .	0,40-50
Cyrena semistriata Desh. . . .	0,30-50
Mytilus socialis A. Br.	0,20-30
Modiola angusta A. Br. . . .	0,50

Wiener Becken.

Gasteropoda.

Murex spinicosta Bronn . . .	0,30-1
„ Sedgwicki Michti. . . .	0,50-2
„ aquitanicus Grat	0,50-2
„ Partschi Hoern	0,40-1,20
„ Swainsoni Michti	1—2
Trophon goniostomus Partsch .	1—2
Typhis fistulosus Brocc. . . .	0,30-1
*Fusus bilineatus Parsch . . .	0,30
„ longirostris Brocc. . . .	0,50-1,50
„ crispus Bors.	0,50-1,50
„ semirugosus Bell et Michti	0,50-80
„ Valenciennesi Grat. . . .	0,50-1
„ rostratus Oliv.	2,—
Pyrula granifera Michti . . .	3,—
Euthria cornea L. var.	1,—
Pleurotoma asperulata Lmk. . .	0,30-80
„ cataphracta Brocc. . . .	0,30-70
* „ turricula Brocc.	0,20-30
„ crispata Jan.	0,50
„ Sandleri Ptsch.	0,80
„ harpula Brocc.	0,80
„ plicatella Jan.	0,80
* „ Lamarcki Bell.	0,20-60
„ bracteata Brocc.	0,80-1
* „ monilis Brocc.	0,20-40
„ rotata Brocc.	0,20-50
* „ obeliscus Desm.	0,20-30
* „ dimidiata Brocc.	0,20-30
* „ coronata Mstr.	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark.
Pleurotoma semimarginata Lmk.	0,30-1
„ spiralis Serr.	0,30-40
„ spinescens Partsch	0,50-80
„ Coquandi Bell.	0,30-50
„ trifasciata Hoern.	0,80
„ Schreibersi Hoern.	0,80
Drillia pustulata Brocc.	1,—
Tritonium Tarbellianum Grat.	0,50-1
Ranella marginata Brongn.	0,50
Phos Hoernesi Semp.	2,—
*Nassa badenensis Partsch.	0,20
„ laevissima Brus.	0,60
„ restitutiana Font.	0,40
„ vindobonensis Ch. Meyer	0,60
„ serraticosta Bronn.	0,30-40
„ signata Patsch.	0,60
*Ancillaria obsoleta Brocc.	0,20-40
„ pusilla Fuchs	0,50
„ glandiformis Lmk.	0,20-40
*Mitra scrobiculata Brocc.	0,20-40
„ Bellardii Hoern.	0,30-80
„ cupressina Brocc.	0,30-60
Columbella subulata Brocc.	0,20-30
„ fallax Hoern.	0,20
Cassis saburon Lmk.	0,20-50
Cassidaria echinophora Lmk. var.	1,—
Natica Alderi Forbes	0,20-40
* „ raropunctata Sassi	0,20-30
„ redempta Michti	0,30-50
„ millepunctata Lmk.	0,20-30
* „ helicina Brocc.	0,20
Scalaria lamellosa Brocc.	3,—
„ lanceolata Brocc.	2—3
Terebra acuminata Borson	0,20-40
„ costellata Sow.	1—2
*Ringicula buccinea Desh.	0,20
Eulima subulata Donovan	0,60
Niso eburnea Risso	0,50
Solarium carocollatum Lmk.	1—2
*Conus Dujardini Desh.	0,20-30
„ antediluvianus Brug.	0,40
„ Daciae Hoern.	3—7
„ extensus Partsch	2—3
„ Puschi Michti	2—3
„ avellana Lm.	2—3
„ Noae Brocc.	6—7
Aporrhais alatus Eichw.	0,20
Cancellaria lyrata Brocc.	0,30-80
„ spinifera Grat.	0,20-60
„ canaliculata Horn.	1,50
Cerithium doliolum Brocc.	0,30-50
„ minutum Serres	0,50
Bittium spina Partsch	0,30-40
Potamides lignitarum Eichw.	0,20-30
Turritella Riepeli Partsch	0,30
„ bicarinata Eichw.	0,20-30
„ Archimedis Brogn.	0,20
„ subangulata Brocc.	0,20
Dentalium pseudoentalis Lmk.	0,30
Dentalium Bouei Desh.	0,20-40
„ Michelottii Hörn.	0,50
* „ badense Partsch	0,20

Acephala.

Lucina glubulosa Desh. Prachtst.	6,—
Arca diluvii Lmk.	0,20-30
Pinna Brocchii d'Orb.	0,50-1
Pecten cristatus Bronn.	0,20-40
„ spinulosus Münst.	0,40-60

Polypi.

Turbinolia spec.?	0,20

Sternberg

(Ob. Oligocaen.)

Murex Deshayesi Nyst.	0,50-3,50
Tiphys Schlotheimi Beyer	0,30-60
„ pungens Sol.	1,—
Fusus Waeli Nyst.	0,40-80
„ scrobiculatus Boll.	1,—
„ elongatus Nyst.	0,20-60
„ elegantulus Phil.	0,50-3
Pisanella subgranulata v. Schloth.	0,40-2
Pleurotoma terebralis Lam.	0,80-1,20
* „ Selysi de Kon	0,30-60
„ Morreni Nyst.	0,30-60
* „ obeliscus Des Moul.	0,20-50
* „ regularis de Kon	0,30-50
„ denticula Bast	0,40-80
„ flexuosa v. Münst.	0,40-60
„ flexuosa v. Münst. var. planospira Speyer	0,30-40
„ obliquinodosa Koch	0,50-60
* „ laticlavia Beyr.	0,20-40
„ turbida Sol.	0,20-40
„ coronata var. trifasciata	0,30-60
Defrancia Naumanni Speyer	0,50-80
Mangilia Ruppardi v. Koen.	0,50-80
„ Koeneni Sp.	0,50-80
Tritonium flandricum de Kon	0,20-50
Cominella Bolli Beyr.	0,20-40
*Nassa pygmaea v. Schloth. var. bispiralis	0,20-40
„ Schlotheimi Beyr.	0,30
Ancillaria Karsteni Koch	0,50-80
Mitra Philippi Beyr.	0,40-60
„ semimarginata Beyr.	0,40-50
„ hastata Karsten	0,50-1
*Cassis megalopolitana Beyr.	0,20-60
Ficula concinna Beyr.	0,30-60
„ condita Brong.	1,-1,50
Natica Nysti d'Orb.	0,20-30
* „ „ var. elevata	0,20-30
* „ dilatata Phil.	0,30-50
Terebra cincta Schloth.	0,40-80
*Ringicula striata Phil.	0,20-30
„ Grateloupi d'Orb	0,20-40
Niso minor Phil.	0,30-60

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mark.
Chenopus speciosus v. Schloth.	0,50-1
Cancellaria evulsa Sol.	0,30-1,20
„ subangulosa Wood.	0,40-60
Tornatella Philippii Koch.	0,20-30
„ punctata-striatus Phil.	0,30-50
Tornatina elongata Sow.	0,40-60
Bulla subperforata Boll.	0,50-80
„ utriculus Br.	0,30-40
„ lineata Phil.	0,50-60
„ acuminata Brug.	0,20-30
* „ Laurenti Bosq.	0,20-30
Scaphander lignarius L.	0,40-60
Siliqua oblonga v. Koenen	0,80
*Corbula gibba Ol.	0,20-30
*Mactra trinacria Semp.	0,20-40
Syndosmya Bosqueti Semp.	0,80
*Cytherea Beyrichi Semp.	0,30-50
*Cardium comatulum Bron.	0,30-60
„ Kochi Semper	0,40-60
Lucina Schloenbachi v. Koen	0,80-1
Cardita tuberculata v. Münst.	0,20-30
*Arca Speyeri Semp.	0,50-80
* „ pretiosa Desh.	0,20-30
„ appendiculata Sow.	0,30-60
„ gemina Semper	0,50-60
*Nucula compta Goldf.	0,20-40
* „ peregrina Desh.	0,30-60
*Leda glaberrima v. Münst.	0,40-80
„ gracilis Desh.	0,20-50
*Yoldia pygmaea v. Münst.	0,20-30
*Pecten Münsteri Goldf.	0,30-50

Tuchořic

(Unt. Miocaen.)

	Mark.
Glandina inflata Reuss	3,—
Oleacina producta Reuss	1-1,50
„ Sandbergeri Thomae	0,30-50
Zonites algiroïdes Reuss	1—2
Hyalinia denudata Reuss	0,50-80
Helix robusta Reuss	0,80-1,50
„ bohemica Bttgr.	0,50-80
„ apicalis Reuss	0,50-80
„ obtusecarinata Sandbgr.	1-1,50
„ Zippei Reuss	0,50-1
„ homalospira Reuss	1-1,50
„ osculum Thomae	0,20-30
„ devexa Reuss	0,40-60
„ Petersi Reuss	2—3
Buliminus complanatus Reuss	1—2
Pupa lamellidens Sandbgr.	0,50
„ intrusa Slavik	1—2
„ callosa Reuss	0,30-40
Pupilla raricosta Slavik	0,30-50
Clausilia tenuisculpta Reuss	3—5
„ polyodon Reuss	4-7,50
„ vulgata Reuss	2,—
Carychium nanum Sandbgr.	0,30
Limnaea subpalustris Thomae	1,50
Planorbis declivis Al. Br.	0,20
„ solidus Reuss	0,50-80

Auch liefern wir ganze Sammlungen, die Hauptformen der verschiedenen Gebiete enthaltend, und zwar:

Mainzer Becken.

	Mark.
50 Species in circa 120 Exemplaren	20,00
75 » » » 150 »	35,00

Wiener Becken.

30 Species in circa 50 Exemplaren	10,00
45 » » » 70 »	18,00

Sternberg.

30 Species in circa 60 Exemplaren	12,00

Sollten Sammlungen **inclusive** Kasten, Schächtelchen und Gläser gewünscht werden, so lassen wir letztere zum Selbstkostenpreise ab.

Eventuelle Wünsche auf Reste **fossiler Säugethiere** etc. des **Mainzer Beckens** wolle man uns mittheilen.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt am Main.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Melampus.	
Adamsianus Pfr. N.-Caledon.	0,20
affinis Desh. Dahlak	0,20-30
Australis Quoy Australien	0,30-40
caffer Krss. Sulu-Ins	0,10-20
castaneus Mühlf. Sandw.-I.	0,20-30
cingulatus Pfr. Cuba	0,20
coffeus L. Antillen	0,20-30
exesus Sossies N.-Caledon.	0,30
fasciatus Desh. Sulu-Insel	0,20-30
flavus Gmel. Antillen	0,30-40
fuscus Desh. Samoa-Ins.	0,20
luteus Quoy Gesellsch.-Ins.	0,20-30
lividus Desh. Mauritius	0,20-30
Massauensis Ehrbg. Massaua	0,10-30
Montrouzieri Sow. N.-Caled.	0,20-30
olivaceus Carp. Californien	0,20
pusillus Gm. Antillen	0,20-30
Siamensis Mart. Siam	0,20-30
strictus Cass. N.-Caledon.	0,30-40
tabagensis Ads. Panama	0,20-30
variabilis Gass. N.-Caledon.	0,20-30
zonatus Mühlf. Philippinen	0,20-30
Pedipes.	
afer Gm. Afric. occid.	0,20-30
affinis Fér. Mauritius	0,40
Pythia.	
leopardus Rve. N.-Caledon.	0,50-60
pantherina Ads. Philippin.	0,50-60
„ var. minor „	0,40
plicata Fér. Bengalen	0,60-1
pollex Hinds Viti-Insel	0,60-80
trigona Troschel Philipp.	0,30-50
Plecotrema.	
rapax Dohrn M. rubrum.	0,40
Cassidula.	
angulifera Pet. Australien	1,—
inflammata Bolten (= felis Lm.) Ostindien	0,50-80
Kraussi Küst Mauritius	0,30-40
labrella Desh. M. rubr.	0,20-30
mustellina „ N.-Zealand	0,30-50
nucleus Martyn Otaheiti	0,20-40
sulculosa Mss. Viti-Insel	0,20-30
Auriculus.	
auris-Judae L. Java	1—2
auris-Malchi Müll. Moluccen	3,—
auris-Midae L. Java	1—3
elongatus Parr. Sandw.-I.	0,30-40
Gangeticus Bens. Calcutta	0,30-40
semisculptus Ads. Viti-Insel	0,30-50
Cyclotus.	
auriculatus Kob. Philippin.	
campanulatus Mart. Hunan	1-1,50
Caroli Kob. I. Bohol	0,50-60
Dysoni Pfr. Mexico	0,50-1

	Mk.
giganteus Gray Columbia	3,—
Hunanus Grdl. Hunan	1-1,20
Jamaicens Chem. Jamaica	0,50-60
Inca Orb. Brasilien	1,—
latecostatus Kob. Philippin.	0,50-60
Lowianus Pfr. Labuan	0,60
Popayanus Lea N.-Granada	0,60-80
seminudus Ads. Jamaica	0,50-60
Cyclosurus.	
Mariei Morl. I. Mayotte	5—8
Pterocyclos.	
brevis Mart. Philippinen	2,—
Alycaeus.	
pyramidalis Bens. Salanga	1,—
strangulatus Hutton O.-Ind.	0,30
Diplomatina.	
Huttoni Pfr. var. occidentale Trinidad	0,10-20
pachycheilus Born Dargeling	0,20-30
Craspedopoma.	
lucidum Lowe Madeira	0,20-30
Cyclophorus.	
aquila Sow. Singapore	1—2
Apiae Reclz. Samoa-Insel	0,40
aurantiacus Sch. Salanga	3,—
Borneensis Mtclf. Borneo	1,50-2,50
canaliferus Sow. I. Luzon	0,80
Cantori Bens. Salanga	0,60-80
eximius, Mouss. Sumatra	7—10
exaltatus Pfr. Honkong	0,80
fulguratus „ Pegu	1-1,20
Indicus „ Ind. orient.	1—2
patens Blfd. Pegu	2-2,50
perdix Brod. et Sow. Sumatr.	1,20
planorbis Blfd. O.-Indien	0,60
punctatus Sow. Ceylon	0,80
raripilus Morl. Mayotte	0,50
semisulcatus Sow. Malacca	1,20
trigrinus Sow. Samar.	1,50-2
Upolensis Mss. Upolu	0,30-50
validus Sow. Philippinen	2,50
Wahlbergi Bens. Cap.	0,40-50
Woodianus Lea I. Luzon	1,—
Leptopoma.	
acutimarginatum Sow. Samar	1,20
Dohrni Ads. et. Ang. N.-Irld.	0,50
distinguendum Dohrn Philip.	0,50
sericatum Pfr. Borneo	0,40
vitreum Less. Salanga	0,30-40
Megalommastoma.	
altum Sow. I. Negros	1,50-2
alutaceum Mke. Cuba	1—2
Antillarum Sow. I. Tortola	0,40-50
auriculatum D'Orb. Cuba	1-1,50
cylinidraceum Chem. Portor.	1—2
funiculatum Bens. Dargeling	1,50-2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
Gundlachi Pfr.	Cuba	2,—
leonium „	„	2,—
Lowei Ads.	Borneo	1,—
Mani Poey	Cuba	1,50
Orbignyi Pfr.	Haiti	1,50-2
procer Poey	Cuba	1,50-2
seminudum Poey	„	1,50-2
sectilabrum Gould	Labuan	1-1,50
ungula Poey	Cuba	1.50-2
Tomocyclus.		
simularum Mor.	Guatemala	2—3
Cataulus.		
Austenianus Bens.	Ceylon	2,—
decorus „	„	2,50-3
haemastomus Pfr.	„	4—5
pyramidatus „	„	2,—
Templemanni „	„	3,—
Thweitesi „	„	2,—
Pupinella.		
rufa Sow.	Japan	0,30-40
Pupina.		
Ambigua Semp.	Luzon	0,30
bilinguis Pfr.	C. York	0,30-40
complanata Psl.	Marshall-I.	0,30
Cumingiana Pfr.	N.-Hebrid.	0,20-30
ephippium Grdlr.	Hunan	0,50-60
fusca Gray	Luzon	0,30
grandis „	Palaos-Insel	0,30
meridionalis Pfr.	P. Dennison	0,30
polita Ads.	Salomon-Ins.	0,30-40
pulchella Möll.	Hunan	0,40
Pfeifferi Dohrn.	Lizard-Ins.	0,30-40
puncticola Crosse	Austral.	0,30
robusta Cox	„	0,30-40
Choanopoma.		
fimbriatulum Sow.	Jamaica	0,30-50
hystrix Wright	Cuba	1—3
scabriculum Sow.	Jamaica	0,60-80
Yaterascense Pfr.	Cuba	0,60
Ctenopoma.		
semicoronatum Gdlch.	Cuba	0,40-60
Adamsiella.		
Grayana Pfr.	Jamaica	0,50-60
variabilis Ads.	„	0,30-40
Otopoma.		
cuilini Pet.	Zanzibar	2,—
Listeri Cray	Mauritius	0,30-40
Cyclostomus.		
albus Sow.	Jamaica	0,40
articulatus Gray.	I. Rodrg.	1,—
balteatus Say	Madagascar	0,80-1,20
Barclayanus Pfr.	Mauritius	0,80-1,20
Banksianus Sow.	Jamaica	0,30-40
bicarinatus „	Madagasc.	1,20
carinatus Born	Mauritius	1—2
Chevalieri Ads.	Jamaica	0,20-30
campanulatus Pfr.	Madagasc.	1-1,50
Cuvierianus Pet.	„	4—5
filostratus Sow.	Madagasc.	0,80-1
Humphreysianus Pfr.	Jamaic.	0,20-30
Jayanus Ads.	„	0,10-20
levis Pfr.	Salomon-Ins.	0,20-30
Lachaineri Gdlch.	Cuba	0,40
Newcombianus Ads.	St. Jan	0,30-40
Rollei Weinl.	Haiti	0,30-40
solidulum Gdlch.	Cuba	0,30
semilabre Lm.	Haiti	0,50-60
tractum Gdlch.	Cuba	0,40-60
tricarinatus Müll.	Mauritius	0,80
unicolor Pfr.	„	0,60-1
„ v. sulcatus „	„	0,50-1
zonulatus Fér.	Madagascar	1,20
Tudora.		
Augustae Ads.	Jamaica	0,30
columna Wood	„	0,40-60
megachila Pot. et M.	Curacao	0,40-50
versicolor Pfr.	„	0,40-50
Cistula.		
rufilabris Beck.	S. Croix	0,10-20
Chondropoma.		
limbiferum Mke.	Haiti	0,40-60
marginalbum Gdlch.	Cuba	0,50-60
Newcombianum Pfr.	St. Thom	0,20-30
obesum Mke.	Cuba	0,30-50
pictum Pfr.	„	0,60-80
pudicum Orb.	„	0,60
revinctum Poey	„	0,50-60
sacrum „	„	0,80-1
Realia.		
Cheneyi Dohrn	Peleliu-Ins.	0,20-30
manpiensis Grt.	Manpili-Ins.	0,20-30
Blandiella.		
reclusa Guppy	Trinidad	0,30
Trochatella.		
pullchella Gray	Jamaica	0,10-20
regina Mor.	Cuba	0,80-1,50
Tankervillei Gray	„	0,80-1
Lucidella.		
aureola Fér.	Jamaica	0,10-20
„ v. granulosa Ads.	„	0,10-20
Alcadia.		
Brownei Gray	Jamaica	0,40
„ v. alba „	„	0,30
Hollandri Pfr.	„	0,30
major Gray	„	0,30-40
palliata Ads.	„	0,20-30

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. Müller zu adressiren.
Briefe einfach an die „LINNÆA", Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

	Mk.
Nanina.	
atrofusca Alb. Borneo	2,—
bistrialis Bk. Hymalaya	1-1,20
Brookei Ads. et Rve. Borneo	7—9
Cambojiensis Rve. Siam	12—20
citrina L. Ceram	0,60-1
Decrespignyi Higg. I. Labuan	2—3
densa Ads. et Rve. Philipp.	2,—
distincta Pfr. Cochinchina	1,50-2
glauca Bens. Himalaya	0,30-40
Humphreysiana Lea. Philipp.	0,60-1
inversicolor Fér. Mauritius	0,40-1
leucostyla Pfr. „	0,50-60
Nouletii Lequill. Viti Ins.	0,50-60
ovum Val. Philippinen	2,50-3
porphyrea Pfr. „	1,50-2
rareguttata Mss. Timor	1,50
regalis Bens. Borneo	1,50-2
resplendens Phil. Salanga	0,60-1,20
semiglobosa Pfr. Philipp.	1,50
semigranosa Rve. Labuan	2,—
Sophiae Gask. Lord Howes I.	1—2
Sowerbyana Pfr. Philipp.	2-2,50
striata Gray Salanga	0,40-50
trifasciata Chm. Bombay	1-1,20
Uranus Pfr. Polillo Ins.	5
vitrinoides Desh. Bengalen	0,60-80
Weinkauffiana Crosse Cochinchina	0,40-50
Wilsoni Semp. Palaos Ins.	0,20-30
Trochonanina.	
Jenynsi Pfr. Zanzibar	0,10-20
Mozambicensis Pfr. „	0,20-30
Macrocyclis.	
Vancouverensis Lea Calif.	0,50-60
Trochomorpha.	
apia Hombr. Hebriden	0,40
Belmorei Cox Salomon Ins.	0,60-80
castra Bens. Salanga	0,60-80
entomostoma Hombr. Carol.	0,60-1
Lomonti Braz. n. sp. Guinea	0,60-80
Metcalfei Pfr. Philippinen	0,40-60
nigritella Pfr. Carolin.	0,20-40
retangula Pfr. Ins. Marq.	0,30
sculpticarina v. Mart. Sal.	1-1,50
Swainsoni Pfr. Raiatea.	0,40
trochiformis Fér. Tahiti	0,30
troilus Gould Samoa Ins.	0,40-50
Cochlostyla.	
annulata Sow. Philippinen	0,60-80
aspera Grt. „	3,—
balteata Sow. „	0,50-80
Boholensis Brod. „	1,20
calobapta Jon. I. Mindoro	1,20-2
chrysallidiformis Sow. Phil.	2,—
cincinnus Sow. „	0,40-60

	Mk.
Dattaensis Semp. Philipp.	2,—
Dryas Brod. „	1,—
electrina Rve. „	2,—
Faunus Brod. I. Zebu	2,—
fulgetrum Brod. Philipp.	2—3
Iloconensis Sow. „	0,60-80
Leai Pfr. „	1,—
leucophaea Sow. I. Luzon	1,—
var. concinna „	1,20
lignaria Pfr. I. Mindoro	2,—
luzonica Sow. Philippinen	2,—
matruelis Sow. „	1,80
metaformis Fér. „	1,50-1,80
Mindoroensis Brod. I. Mind.	1,50-2
mirabilis Fér I. Luzon	1,50-2
monticola Sow. „	1,50-2
Najas Pfr. Celebes	0,80-1
nimbosa Brd. Philippinen	2—3
nympha Pfr. „	1,50-2
opalina Sow. I. Luzon	2,—
Pfeifferiana Brod. Philipp.	2—3
Polillensis Pfr. I. Polillo	1-1,50
polychroa Sow. „	1,50
pulcherrima Sow. Philipp.	0,60
rufogaster Less. „	3—4
speciosa Jay „	1,50-2,50
stabilis Sow. „	1,—
Valenciennesii Eyd. „ (Helix)	1,20
virgo Brod. (Helix) „	1,20-1,50
zonifere Sow. „	1,20-2
zebuensis Brod. (Hel.) „	2,—
Bulimus.	
albizonatus Rve. Ceylon	1,50-2
Alexander Cross. N. Caled.	2,50-3,50
auris-leporis Brug. Brasil.	0,60-80
bilabiatus Brod. Bahia	3,50
Blainvilleanus Pfeiffer Venezuela	2,50
Cantagallanus Rang. Brasil.	2,—
Ceylonicus Rve. Ceylon	2,—
Cleryi Pet. Salom. Ins.	4-4,50
coloratus Nyst. Venezuela	2,—
comes Pfr. Cambodja	2,—
contrarius Müll. I. Timor	0,80
var. furcillatus Mss. Borneo	1,50-2
var. subconcolor I. Timor	0,50-60
crenulatus Pfr. Chile	0,60
dentatus Wood Uruguay	0,60-80
distortus Brüg. Venezuela	1,—
exesus Spix Brasilien	1,50-2
eximius Alb. N. Calodon.	4—6
fibratus Martyn „	2-2,50
Founaki Hombr. Salom. I.	1,80
fulguratus Jay Viti Ins.	1,—
fusiformis Rang Philippinen	1,20-1,80
Grayanus Pfr. Brasilien	3,50

	Mk.
illheocala Moric. Bahia	2—3
interruptus Müll. Moluccen	0,50-1
inversus Müll. Singapore	1-1,20
luzonica Sow. Philippinen	1,50-2
Mac. Farlandi Cox Salom. I.	2,50-3
maculiferus Sow. Mindan.	2-2,50
magnificus Grt. Brasilien	2,—
malleatus Jay Viti Ins.	1,20
melanostomus Sw. Brasilien.	1-1,50
miltocheilus Rve. Salom. I.	1—2
navicula Wag. Bahia	2,—
obliguus Pfr. „	0,50-80
oblongus Müll. S. Amerika	0,50-1,50
pachychilus Pfr. Chile	1,—
Pancheri Crosse N. Caled.	1,50
perversus L. Singapore	0,50-80
piperitus Sow. var. Peru	0,60
planidens Müll. Brasilien	3,50
porcellanus Rve. Java	0,60-80
pudicus Müll. Brasilien	1—2
rosaceus King Chile	0,80-1,50
Sanchristovalensis Cox Salom. Ins.	2,—
Seemanni Dhrn. Viti Ins.	4,—
Shongii Less. N. Seeland	3,—
signatus Spix Bahia	1,20
sinistralis Rve. Java	1,—
Strangei Pfr. Eddyst. Ins.	0,80-1
Wagneri Pfr. Brasilien	1-2,50

Bulimulus.

albus Sow Chile	0,30
alternans Beck Panama	0,60
Altoperuvianus Rve. Peru	1,50-2
Anguillensis Pfr. Anguilla	0,60
apodemetes Orb. Bolivia	0,50
Capueira Spix Brasilien	1,50
Catlowiae Pfr. Gallop.	1,—
dealbatus Say Alabama	0,40
derelictus Brod. Bolivia	0,40
exilis Gm. Westind.	0,10-20
var. Guadaloupensis Gdl. Guadeloupe	0,20-30
Farrisii Pfr. Peru	1,50-2
fraterculus Fér. Westind.	0,50
Hartwegi Pfr. Ecuador	2,50
Jonasi Pfr. Br. Honduras	0,80-1
Knorri „ Venezuela	2,—
Laurentii Sow. Peru	0,30-40
Lobbii Rve. „	0,30
Mariae Alb. Mexico	0,80
nigrofasciatus Pfr. N. Granada	0,60
nux Brod. Gallop.	0,80-1
Nystianus Pfr. Quito	1,20
Onager Beck Brasilien	0,80-1
Peruvianus Brug. Peru	0,80-1
Philippii Pfr. „	0,50
Proteus Brod. „	1,—
pupiformis Brod. Chile	0,60
rhodostomus Gray Swan River	1,—
saccatus Pfr. Peru	0,50-1,20
Sachsei Alb. Columb.	1,—
scalariformis Brod. Peru	0,40-50
sepulchralis Poey Havan.	0,40
sporadicus Orb. S. America	1,—
terebralis Pfr. Peru	0,60
violaceus Mss. Bolivia	1,20
virgulatus Fér. St. Thomas	0,30-40
var. caribaeorum Lm. Antill.	0,30-40
var. Kammereri St. Croix	0,40
vittatus Spix Brasilien	0,40-1

Porphyrobaphe.

Fungainrinoi Hid. Ecuador	3-3,50
iostomus Sow. Chile	1,50-2,50
Saturnus Pfr. Peru	4—5

Orthalicus.

fasciatus Müll. Cuba	0,80-1
gallina-Sultana Chm. Guyana	1—3
phlogerus D'Orb. Bolivia	1—2
pulchellus Spix Brasilien	0,80-1
zebra v. undatus Brug. Trinid.	0,20-40
var. albus Venezuela	0,40

Liguus.

Blainianus Poey Cuba	1,—
virgineus L. „	0,50-1

Perideris.

alabaster Rang. I. Princip.	0,80
Martense Smith *defect!* Tanganjka See	2,50

Limicolaria.

Adansoni Pfr. Senegal	1,50-2,50
flammea Müll. W. Afrika	1,20
Pyrrha Alb. Afric. occid.	2,—
tenebrica Rve. W. Afrika	0,80
turbinata „ Liberia	1-1,50

Achatina.

balteata Rve. Gambia	1,20
cebra South Africa	0,60
fulica Fér. Mauritius	0,40-1
inornata Pfr. Ceylon	0,80
marginata Sw. Guinea	1,20-1,50
panthera Fér. Madagascar	0,40
reticulata Pfr. Zanzibar	4,50
semisculpta Pfr. Bengalen	0,80-1
suturalis „ Gabon	1,20

Pseudachatina.

Downesii Gray Fernando	5,—
Wrighti Sow. Old. Calabar	4-4,50

Carelia.

Cumingiana Pfr. Sandw. I.	3,00

Columna.

flammea Martyn I. Princip.	6,—
Eucalodium Blandianum Cross. et F. Mexico	6,—

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. **Müller** zu adressiren
Briefe einfach an die „LINNÆA", Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 54. 1884.

LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

Meeresconchylien

aus dem palaearctischen Faunengebiete.

Erste Abtheilung.

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

	Mk.
Ovula.	
adriatica Sow.	0,30-50
carnea Poir.	0,20-30
„ var. albida	0,40
spelta L.	0,40-60
Cypraea.	
europaea Mtg.	0,10-20
lurida L.	0,30-1
pyrum Gm.	0,50-1
pulex Sol.	0,10-20
spurca L.	0,30-50
Erato.	
laevis Don.	0,20-30
Marginella.	
clandestina Broc.	0,20-30
miliaria L.	0,10
minuta Pfr.	0,20-30
Cymbium.	
papillatum Schum.	2,—
Mitra.	
cornicula L.	0,20-40
ebenus Lm.	0,30-50
tricolor Gm.	0,10-20
Columbella.	
avara Say	0,30-40
Hollbölli Möller	0,80-1,20
lunata Sow.	0,20
minor Scac.	0,20-40
rustica L.	0,10-20
scripta L.	0,10-20
„ v. Gervillei Payr.	0,10-20
Cassis.	
saburon Brug.	0,30-60
sulcosa Brug.	0,20-1
Cassidaria.	
echinophora L.	0,20-50
tyrrhena Kien.	3—5
Dolium.	
galea L.	0,50-1
Cyclope.	
nerita L.	0,10-20
„ var. pellucida	0,10-20
„ „ Kamiesch Dsh.	0,20-30
Nassa.	
Cuvieri Payr.	0,20
cornicula Oliv.	0,10-20
gibbosula L.	0,20-50
incrassata Müller.	0,10-20
limata Chm.	0,30-60
mutabilis L.	0,20-40
obsoleta Say	0,20-30
reticulata L.	0,20-30
trivittata Say	0,10-30
varicosa Turt.	0,20-30
variabilis Phil.	0,10-20
Buccinum.	
Amaliae Verkr.	2—4
elegans „ defect!	2—3
fragile „	1—3
finmarchianum Verkr.	0,50-1,50
glaciale L.	2—4
groenlandicum Chm.	0,50
Humphreysianum Ben.	2—4
undatum L.	0,30-1
„ var. pelagicum Sars	0,50-1
„ var. zetlandic. Jeffr.	1—2
undulatum Möll.	2—3

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Totteni Stimps	3—4
tenue Gray	3—4
Purpura.	
canaliculata Ducl.	0,30-50
emarginata Desb.	0,60-80
haemastoma L.	0,20-50
lapillus L.	0,10-20
var. imbricata Lm.	0,20-30
lactuca Esch.	0,80-2
Coralliophila.	
scalaris Broc. = Meyendorfi Calc.	1-1,50
Ocenebra.	
aciculata Lm.	0,20-40
Edwardsi Parr.	0,10-30
erinacea L.	0,30-2
var. Tarentina Lm.	0,50-1
gibbosa Lm.	1—3
Murex.	
brandaris L.	0,20-1
var. coronatus	1—2
cristatus Broc.	0,20-40
trunculus L.	0,20-1
Tiphys.	
tetrapterus Bronn	0,50-1
Tritonium.	
corrugatum Lm.	0,50-2
cutaceum L.	0,50-1
nodiferum Lm.	1—3
parthenopeum v. Salis	1—3
Epidromis.	
reticulatum Blainv.	0,20-30
Bufonaria.	
scrobiculator L.	2—3
Ranella.	
gigantea Lm.	1,50-4
Fascicolaria.	
lignaria L.	0,20-50
Trophon.	
barvicensis Johnst.	0,50-1
craticulatus Fabr.	1—2
„ var. grandis	5—6
clathratus L.	0,50-1
var. Gunneri Lov.	1,50-1,50
cinereus Say	0,40-80
Geversianus Pall.	2—5
muricatus Mtg.	0,40-80
truncatus Ström.	0,20-50
Pollia.	
D'Orbygni Payr.	0,10-20
leucozona Phil.	0,20-40
picta Scacchi.	0,60-80
Pisania.	
maculosa Lm.	0,10-20
Eutria.	
cornea L.	0,20-50
var. minor.	0,30
Neptunea.	
antiqua L.	0,50-1
Beringii Midd. defect!	6,—
despecta L.	1—3
var. carinata	1—3
var.varicosa-carinata	2—4
decemcostata Say	3—8
tornata Gould	3-4,50
Turtoni Bean.	4—10
Sipho.	
curtus Jeffr.	3—10
gracilis F. et H.	1—2
glaber Verkr.	2—5
islandicus Chm.	10—20
Jeffreysianus Fischer	3—5
KroyeriMöller defect!	6—10
propinguus Alder	2—5
pygmaeus Gould	1—2
striatus Rve.	2—3
Fusus.	
craticulatus Broc.	0,20-60
pulchellus Phil.	0,20-60
rostratus Olivi	0,40-2
Sitchensis Midd.	0,50-1,20
syracusanus L.	0,30-80
Lachesis.	
candidissima Phil.	1,—
minima Mtg.	0,10-20
var. mamillata Risso	0,20-30
Pleurotoma.	
nivalis Lovén	1—3

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Bela.	
mitrula Lovén	0,30-50
Mörchi Malm	1—2
pyramidalis Ström	0,30-60
septangularis Mtg.	0,30-50
simplex Midd.	0,50-2
turricula Mtg.	0,20-30
var. excarata Möller	0,20-30
„ nobilis „	0,50-1
„ rosea Sars	0,30-40
Trevelyana Turt.	0,50-1
violacea Migh. et Ads.	0,20-40
Raphitoma.	
attenuata Mtg.	0,20-60
brachystoma Phil.	0,50-80
Bertrandi Payr.	0,20-40
clathrata Serr.	0,30-50
costata Don.	0,50-80
gracilis Mtg.	0,40-60
Leufroyi Mich.	0,30-80
linearis Mtg.	0,20-50
multilineata Desh.	0,20-40
nebula Mtg.	0,20-40
paciniana Calcara	0,20-30
purpurea Mtg.	0,20-50
var. Philberti Mich.	0,20-40
rugulosa Phil.	0,30-50
reticulata Ren.	0,30-60
taeniata Desh.	0,30-50
Vauquelini Payr.	0,50-60
Conus.	
mediterraneus Brug.	0,20-1
Chenopus.	
occidentalis Beck.	2—6
pespelicani L.	0,20-50
Serreseanus Mich.	2—3
Cerithium.	
conicum Blainv.	0,20-40
elegans Blainv. u. Desh.	0,20-40
metaxa Sow.	0,30-50
metula Lov.	0,50-1,20
mediterraneum Desh.	0,20-30
pusillum Jeffr.	0,20-40
scabrum Olivi	0,10 20
var. lima Brug.	0,10-20
vulgatum „	0,20-50

	Mk.
Triforis.	
preversa L.	0,10-20
Cerithiopsis.	
costulaia Möller	0,50-1
minima Brus.	0,20-30
tubercularis Mtg.	0,20-30
Cancellaria.	
cancellata L.	1—2
Trichotropis.	
canaliculatus Leach.	1—3
var. acuminata Jeffr.	0,50-1,50
insignis Midd.	2—4
St. Johnensis Verkr.	2—4
Natica.	
affinis Gm.	0,20-80
Guillemini Payr.	0,20-40
Groenlandica Beck.	0,40-80
hebraea Mart.	0,40-60
helicina Broc.	0,20-40
heros Say	0,50-3
islandica Bean.	0,40-80
immaculata Tott.	0,20-40
Josephinia Risso	0,20-40
intricata Don.	0,20-30
macilenta Phil.	0,20-40
millepunctata Lm.	0,40-60
pallida Brod. et Sow.	3—4
pulchella Risso	0,20-40
trifasciata Say	0,30-50
Sigaretus.	
striatus M. de Perr.	0,50-1,20
Velutina.	
laevigata Penn.	0,20-50
zonata Gould.	1,—
Lamellaria.	
perspicua L.	0,20-40
Adeorbis.	
subcarinatus Mtg.	0,20-30
Skenea.	
planorbis Fabr.	0,10
Homalogyra.	
atomus Phil.	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Littorina.	
curila Midd.	0,20-30
grandis Midd.	0,50-1,20
littorea L.	0,10-20
neritoides L.	0,10-20
obtusata L.	0,10-20
var. groenlandica Mörch	0,10-20
„ limata Lovén	0,10-20
punctata Gmel.	0,20-30
rudis L.	0,10-20
var. sexatilis Johnst.	0,10-20
„ tenebrosa Mtg.	0,10 20
sitchana Phil.	0,30-40
vestita Say	0,10-20
Lacuna.	
crassior Mtg.	0,30-40
divaricata Fabr.	0,20-30
var. quadrifasciata Mtg.	0,20-30
„ solidula Lovén	0,20-40
puteolus Turt.	0,20-40
pallidula (Da Costa) F. et H.	0,20-30
Fossarus.	
ambiguus L.	0,30-50
Rissoina.	
Bruguièri Payr.	0,10-20
Rissoa.	
auriscalpium L.	0,10
algeriana Montr.	0,10-20
arenaria Ads.	0,10-20
caribaea D'Orb.	0,20
castanea Möller	0,70
calathus F. et H.	0,20-30
costulata Alder	0,20
cimex L.	0,10
cingillus Mtg.	0,10
crenulata Mich.	0,10
costata Ads.	0,10
dictyophora Phil.	0,20-30
decorata Phil.	0,20
fulgida Ads.	0,10
fulva Mtg.	0,10
Jan Meyeni Friele	0,20-40
inconspicua Alder	0,10-80
Jeffreysii Waller	0,30-40
labiosa Mtg.	0,20
lactea Michaud	0,50
Lanciae Calc.	0,30-40
lilacina Reclz.	0,20
lineolata Mich.	0,20
Mariae Hörnes	0,30
membranacea Ads.	0,20
monodonta Phil.	0,20
Montacuti Payr.	0,10-20
oblonga Desm.	0,20
parva (Da C.) F. et H.	0,10
var. interrupta Ads.	0,10
punctura Mtg.	0,10
pusilla Phil.	0,20-30
radiata „	0,20
reticulata Mtg.	0,10
robusta Dall.	0,30-40
rudis Phil.	0,30-40
seminulum Montr.	0,20-30
semistriata Mtg.	0,10-20
similis Scacchi	0,50
var. laevis Montr.	0,30-40
soluda Phil.	0,10-20
subcostulata Schw.	0,10-20
striata Mtg.	0,10
var. saxatilis Möller	0,20
striatula Mtg.	0,30-40
tesselata Schw.	0,20
variabilis v. Mühlf.	0,10
v. splendida Eichw.	0,20
venusta Phil.	0,10
ventricosa Desm.	0,10
violacea Desm.	0,10-20
v. rufilabrum Leach.	0,10
vitrea Mtg.	0,20
Weinkauffi Schw.	0,20
zetlandica Mtg.	0,30-40
Barleia.	
rubra Ads.	0,10
var. pallida Jeffr.	0,10
var. unifasciata Mtg.	0,10
Jeffreysia.	
diaphana Alder	0,20-30
globularis Jeffr.	0,20-30
opalina „	0,20-30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Hydrobya.	
ulvae Penn.	0,10
var. octona L.	0,10
Truncatella.	
truncatula Drap.	0,10
Caecum.	
auriculatum Folin	0,20-30
glabrum Mtg.	0,10-20
subangulatum	0,20-30
trachea Mtg.	0,10-20
Siliquaria.	
anguina L.	6—10
Vermetus.	
intortus Lm.	0,40-50
lumbricalis Gm.	0,50-1,20
triqueter Biv.	0,20-60
Turritella.	
acicula Stimp.	0,30-50
communis Risso	0,10-30
polaris Beck.	0,50-1
triplicata Broc.	0,40-1
Mesalia.	
brevialis Lm.	1-2,50
lactea Möller	0,50-1
Scalaria.	
communis Lm.	0,20-50
clathratula Mtg.	0,50-80
pseudoscalaris Broc.	0,20-60
tenuicostata Mich.	1,50-1,20
Trevelyana Leach.	1—2
Eulima.	
polita Risso	0,50-1,50
„ v. brevis Reg.	0,20-30
Philippii Wkff.	0,20
stenostoma Jeffr.	0,30-45
sinuata Sc. var. intermedia Cantr.	0,20-50
subulata Don.	0,40-80
Eulimella.	
acicula Phil.	0,20-30
var. obeliscus Jeffr.	0,30-40
„ ventricosa Forb.	0,30-40
bilineata Ald.	0,30-60
Scillae Scacchi	0,30-50
Odontostoma.	
albella Lovén	0,20-40
acuta Jeffr.	0,20-40
conoidea Broc.	0,20-40
var. Australis Jeffr.	0,50
insculpta Mtg.	0,20-40
nivosa Mtg.	0,30-50
pallida Mtg.	0,20
var. angusta Jeffr.	0,20-30
„ novogradensis Bruss.	0,20-30
plicata Mtg.	0,30-50
rissoides Hanl.	0,30-50
turrita Hanl.	0,40-40
truncatula Jeffr.	0,30-40
unidentata Mtg.	0,20-40
Auriculina.	
Erjaveciana Bruss.	0,20-30
Turbonilla.	
decussata Mtg.	0,30-50
delicata Montr.	0,20-30
excavata Phil.	0,30-50
eximia Jeffr.	0,10-20
fenestrata Forb.	0,20-30
indistincta Mtg.	0,10-20
interstincta Mtg.	0,10-20
var. monozoa Bruss.	0,20-30
interrupta Totten	0,40-50
lactea L.	0,10-30
pusilla Phil.	0,30-50
scalaris Phil.	0,30-40
var. rufescens Forb.	0,30-50
spirialis Mtg.	0,20-40
striolata L.	0,20-30
Actaeon.	
tornatilis L.	0,20-40
Cylichna.	
alba Lovén	0,10-30
cuneata Tib.	0,20-30
cylindracea Mtg.	0,20-40
Jeffreysi Wkff.	0,20-40
nitidula L.	0,20-40
Reinhardti Hölb.	0,40-60
striatula Forb.	0,20-30
umbilicata Mtg.	0,10-20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Utriculus.	
canaliculatus Say	0,30-40
Gouldi Couth	0,20-30
hyalinus Turt.	0,50-1
minutissima Mart.	0,10-20
mamillatus Phil.	0,10-20
obtusus Mtg.	0,10-20
truncatus Mtg.	0,19-20
Amphisphyra.	
debilis Gould.	0,30-60
Bulla.	
hydatis L.	0,10-50
var. cornea Lm.	0,10-30
„ elegans Leach.	0,10-30
striata Brug.	0,20-50
Seaphander.	
lignarius L.	0,20-1
punctostriatus Migh.	1—5
Akera.	
bullata *M*üller	0,20-50
Philine.	
aperta L.	0,20-50
catena Mtg.	0,20-40
Finnmarchiana Sars	0,50-80
punctata Clark.	0,30-50
quadrata S.W.	0,50-80
scabra Müller	0,30-50
Lobiger.	
Philippi Krotm.	0,20-60
Aplysia.	
depilans L.	0,30-50
Pattisoni Sow.	0,60
punctata Cuv.	0,20-40
Umbrella.	
mediterranea Lm.	1—2
Assiminea.	
Grayana Leach.	0,10-20
Melampus.	
bidentatus Mtg.	0,20-30
myosotis Drap.	0,20-30
Otina.	
otis Turt.	0,20-40
Siphonaria.	
algesirae Quoy	0,30-60
thersites Carp.	0,60-80

	Mk.
Gadinia.	
Garnoti Payr.	0,20-50
Calyptraea.	
chinensis L.	0,20-40
Capulus.	
hungaricus L.	0,50-1
Crepidula.	
fornicata Gray.	0,30-50
glauca Say.	0,30-40
lingulata Gould	0,20-30
Moulinsi Mich.	0,20-50
plana Lm.	0,30-40
unguiformis L.	0,20-30
Crucibulum.	
striatum Say.	0,30-40
Neritina.	
viridis L.	0,10-20
Xenophora.	
mediterranea Per.	4—6
Phasianella.	
pullus L.	0,10-80
speciosa v. Mühlf.	0,10-20
tenuis Mich.	0,10-20
Turbo.	
rugosus L.	0,50-1
sangarensis Schrenk	0,50-60
Cyclostrema.	
Cutlereanum Cl.	0,20-40
serpuloides Mtg.	0,20-30
Mölleria.	
costulata Möller	0,25-50
Clanculus.	
corallinus Gm.	0,20-40
cruciatus L.	0,10-20
Jussieui Payr.	0,10-20
Trochus.	
articulatus Lm.	0,20-30
Adansoni Payr.	0,10-20
albidus Gm.	0,20-50
conulus L.	0,20-50
crassus Pult.	01,0-20
cinerarius L.	0,10-20
divaricatus L.	0,10-20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
depictus Desh.	0,20-30
dubius Phil.	0,20-30
exiguus Pult.	0,10-20
Fermonii Payr.	0,10-30
fanulum Gm.	0,20-50
granulatus Born.	0,20-60
iridescens Midd.	0,30-40
Languieri Payr.	0,10-30
lineatus Lm.	0,20-30
millegranus Phil.	0,20-50
magus L.	0,20-1
occidentalis Migh.	2—4
obliquatus Gmel.	0,10-20
Raketi Payr.	0,20-30
rarelineatus Mich.	0,20-30
Richardi Payr.	0,20-40
striatus L.	0,10-20
turbinatus Born.	0,20-30
tumidus Mtg.	0,30-50
turbinoides Desh.	0,20-40
umbilicaris L.	0,10-20
villicus Phil.	0,10-30
varius L.	0,10-30
zizyphinus L.	0,20-60
var. Lyonsii	1-1,50
Margarita.	
bella Verkr.	1—2
cinerea (Gld.) Couth.	0,20-50
groenlandica Chm.	0,20-30
helicina Fabr.	0,20-30
obscura Couth.	0,20-50
olivacea Braun	0,30-56
striata Brod. et Sow.	0,50-1,50
umbilicalis Brod. et Sow.	0,60-2
Vahli Möll.	0,30-40
varicosa Migh.	0,50-80
Scissurella.	
crispata Flem.	0,20-50
costata D'Orb.	0,30-50
Haliotis.	
tuberculata L.	0,20-50
Fissurella.	
costaria Defr.	0,30-60
graeca L.	0,20-40
gibba Phil.	0,20-30
Puncturella.	
Noachina L.	0,20-50
Emarginula.	
cancellata Phil.	0,20-50
conica Schum.	0,30-60
crassa Sow.	1,50-6
elongata Costa	0,20-30
fissura L.	0,29-50
Huzardi Payr.	0,20-40
tenera Montr.	0,30-40
Lepeta.	
caeca Müller	0,30-60
Pilidium.	
fulvum Müller	0,30-50
rubellum Fabr.	0,20-30
Tectura.	
cassis Esch.	0,29-40
digitalis Esch.	0,10-40
patina Esch.	0,20-50
pellucida L.	0,20-50
spectrum Nutt.	0,20-40
testudinalis Müll.	0,20-30
virginea Müll.	0,20-40
Patella.	
ferruginea Gm.	0,80-1,20
lusitanica „	0,30-50
magellanica „	0,40-1,20
vulgata L.	0,10-20
var. caerulea L.	0,10-30
Chiton.	
albus L.	0,20-40
atratus Sow.	1,—
cancellatus Wood	0,20-50
discrepans Brown.	0,30-40
fulvus Wood.	0,20-1
fascicularis L.	0,30-50
laevis Penn.	0,20-40
lineata Wood.	1,20
marmoreus Fabr.	0,20-30
magellanicus Chem.	1,50
marginatus Penn.	0,20-40
Polii Phil.	0,30-40
ruber L.	0,20-40
Rissoi Payr.	0,40-50
Siculus Gray.	0,30-50
submarmoreus.	0,30-60
tunicatus Wood	0,60-80

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Dentalium.	
agile Sars	0,30-50
abyssorum Sars	0,20-30
dentalis Lm.	0,20-30
entalis L.	0,20
novemcostatum Lm.	0,20-30
rufescens Phil.	0,30-50
tarentinum Lm.	0,20-30
Siphonodentalium.	
affine Sars	0,30-50
Lefotense Sars	0,40-50
quinquangulareForb.	0,20
vitreum Sars	0,50-1
Dischides.	
bifissus Wood	0,20-30
Hyalaea.	
inflexa Les.	0,20
longirostris Les.	0,30
tridentata Forsk.	0,20-30
Clio.	
pyramidata Lm.	0,20-40
subulata Quoy et G.	0,30-40
Creseis.	
vitrea Dkr.	0,20-30
Carinaria.	
mediterraneaPer.etL.	2,50-4
Argonauta.	
argo L.	3—10
Spirula.	
Peroni Lm.	0,30-1

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.